

勝昌藥誌

ISSN 0255-6154

蟬蛻



夏

第五十七卷第二期

中華民國一一四年六月三十日出版

中華郵政臺字第 2717 號登記執照登記為第一類新聞紙類



發行所：勝昌藥誌雜誌社

創刊日期：1969 年 01 月 15 日

出刊日期：2025 年 06 月 30 日（第五十七卷第二期，總號第 226 期）

地址：臺北市中正區和平西路二段 56 號

本刊英文通訊處：No. 56, Sec. 2, Heping W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10070, Taiwan

網址：<http://www.herb.com.tw>

電話：02-23011268

主編者：本刊編輯委員會

地址：桃園市中壢區民族路六段 436, 436-1 號

電話：03-4909682 分機 317

傳真：03-4201998

勝昌藥誌叢書購買方式

請參考叢書目錄，將欲購買品項售價總金額，匯款或轉帳至：

銀行：彰化銀行 (009)

分行：光復分行 (5609)

戶名：勝昌製藥廠股份有限公司

帳號：5609-01-16971-7-00

※ 手續完成後，請電話告知。連絡電話：03-4909682 分機 317

勝昌藥誌叢書目錄

書名	編著	定價	售價
常用中草藥手冊	李沐勳、李威著	250 元	200 元
勝昌藥誌 37-39 卷合訂本		900 元	720 元
勝昌藥誌 40-42 卷合訂本		900 元	720 元
勝昌藥誌 43-45 卷合訂本		900 元	720 元
勝昌藥誌 46-48 卷合訂本		900 元	720 元
勝昌藥誌 49-51 卷合訂本		900 元	720 元
勝昌藥誌 52-54 卷合訂本		900 元	720 元



勝昌製藥



關心您的健康



好藥出自好藥材

勝昌為優良產品的原料嚴格把關

先進的萃取、濃縮設備

陣容堅強的研發團隊

製造出有效且精純的優質產品



勝昌製藥廠股份有限公司
SHENG CHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

公 司：台北市和平西路二段56號
中壢廠：桃園市中壢區民族路六段436號
網 址：<http://www.herb.com.tw>

電 話：(02)23011267
電 話：(03)4909682



勝昌草本保健

日夜守護家人健康



關鍵靈活不卡關
每日1顆搞定

東方草本與現代科學的關鍵突破！龜鹿萃取加非變性二型膠原蛋白，幫助行動順暢、靈活再現！



對付健康隱形殺手
促進新陳代謝

以紅麴為首，納豆萃取物(含納豆激酶)和紅景天為輔，幫助調整體質、促進新陳代謝。

代謝
金三角



草本配方



紅麴



納豆



勝昌製藥廠股份有限公司
營運總部：臺北市中正區和平西路二段56號
中壢廠：桃園市中壢區民族路六段436,436-1號
免付費服務專線：0800-261-099

watsons
販售通路：獨家販售

momo 購物網



購物商城

目錄 Contents

勝昌藥誌
第五十七卷第二期

04 封面圖片說明 -- 蟬蛻

07 臺灣常用中草藥 -- 紅楠皮

09 中藥飲片炮製介紹 -- 石決明

14 專題報導 -- 天麻之本草與現代

研究概述（下）


21 勝昌新聞 -- 勝昌製藥四度共襄

大甲媽遶境

28 勝昌新聞 -- 終於隨香成行，

勝昌願以腳步報恩

31 醫藥新聞 -- 藥品分級面面觀



封面圖片說明 --- 蟬蛻

本刊資料室



【基原】

為蟬科 Cicadidae 昆蟲黑蚱 *Cryptotympana atrata* (Fabricius) 的幼蟲羽化時脫落的蛻殼。（《臺灣中藥典》）

【原動物】

體大色黑而有光澤；雄蟲長 4.4 ~ 4.8 cm，翅展約 12.5 cm，雌蟲稍短。複眼 1 對，大形，兩複眼間有單眼 3 只，觸角 1 對。口器發達，刺吸式，唇基梳狀，上唇寬短，下唇延長成管狀，長達第 3 對足的基部。胸部發達，後胸腹板上有一顯著的錐狀突起，向後延伸。足 3 對。翅 2 對，膜質，黑褐色，半透明，基部染有黃綠色，翅靜止時覆在背部如屋脊狀。腹部分 7 節，雄蟬腹部第 1 節間有特殊的發音器官，雌蟬

同一部位有聽器。

棲於楊、柳、榆、槐、楓楊等樹上。經過一個世代往往要 12 ~ 13 年。分佈於中國遼寧以南的大部分地區。（《中華本草》）

【藥材性狀】

1. 一般性狀：

本品形似蟬而中空，足爪多相抱而俯首彎曲狀，長 2 ~ 4 cm，寬 1.5 ~ 2 cm，表面黃棕色，呈半透明，有光澤。頭部有絲狀觸角 1 對，多已斷落，複眼突出，額部先端突出，口吻發達，上唇寬短，下唇伸長成管狀。胸部背面呈十字形裂片，裂口向內彎曲，脊背兩旁具小翅 2 對；腹部有足 3 對，被黃棕細毛；胸部前足骨節膨大，其下側具刺，形成開掘式足。腹部鈍圓，尾端為三角狀鈍尖，共 9 節。體輕，膜質，易碎。無臭，味淡。

2. 粉末：

本品粉末黃棕色。體壁碎片黃褐色，類方形或不規則形。密佈乳頭狀突起，剛毛基痕可見；有的表面僅有剛毛基痕；有的僅具乳頭狀突起。剛毛長短不等，黃棕色或紅棕色剛毛多見，長

$15 \sim 23 \mu\text{m}$ ，毛窩明顯可見，略成雙圓圈狀。氣管壁多破碎成環狀或片狀，無色，環紋細密，螺旋絲排列成弧形。（《臺灣中藥典》）

【採收加工】

在夏季、秋季可到蟬所棲息的樹下附近地面收集，或樹幹上採集。收集後去淨泥雜，曬乾。可用竹簍包裝置高處保存，防止壓碎和潮濕。（《中華本草》）

【藥性】

《中華本草》：「味甘、鹹，性涼。歸肺、肝經。」

《寶慶本草折衷》：「味甘，寒，無毒。」

《品滙精要》：「氣薄味厚，陰中之陽。」

《醫學入門·本草》：「甘、鹹，氣清涼。」

《本草經疏》：「入肝。」

《本草正》：「味微甘、微鹹，性微涼。」

《玉楸藥解》：「味辛，氣平。入手太陰肺經。」

《要藥分劑》：「可升可降，陰中陽也。」

《本草再新》：「味淡，性寒，有微毒。入肝、脾、肺三經。」

《臺灣中藥典》：「甘，寒。歸肺、肝經。」

【功能與主治】

《中華本草》：「宣散風熱，透疹利咽，退翳明目，祛風止癆。」

《別錄》：「主小兒癇，女人生子不出。」



蟬蛻





蟬蛻

灰服之，主久痢。」

《藥性論》：「主治小兒渾身壯熱，驚癇，兼能止渴。」

《本草拾遺》：「研一錢匕，井華水服，主啞病。」

《本草衍義》：「治目昏翳。又水煎殼汁，治小兒出瘡疹不快。」

《本草蒙筌》：「去翳膜侵睛，胬肉滿眥。」

《醫學入門 · 本草》：「主風邪頭眩，皮膚瘡癩疥癩，小兒驚癇、夜啼，癲病，殺疳蟲。」

《綱目》：「治破傷風及疔腫毒瘡，大人失音，小兒噤風天吊，陰腫。」

《雷公炮製藥性解》：「通乳汁。」

《醫林纂要 · 藥性》：「緩肝養肺，去血

熱，除風濕。」

《臺灣中藥典》：「散風除熱，利咽，透疹，退翳，解瘻。」

【用法用量】

《中華本草》：「內服：煎湯，3～6 g；或入丸、散。外用：適量，煎水洗；或研末調敷。」

《臺灣中藥典》：「3～7.5 g。」

【使用注意】

《中華本草》：「孕婦慎服。」

《本草經疏》：「痘疹虛寒證不得服。」

《得配本草》：「多服泄元氣。」

《臺灣中藥典》：「孕婦慎用。」

臺灣常用中草藥 --- 紅楠皮

本刊資料室



【基原】

為樟科 Lauraceae 植物紅楠 *Machilus thunbergii* Sieb. et Zucc. 的根皮、樹皮。

【型態特徵】

又名：山樟樹（湖北），白漆柴、烏樟、釣樟（天目山藥用植物誌）。

常綠中等喬木，通常高 10 ~ 15(~ 20) m；樹幹粗短，胸圍可達 2 ~ 4 m。枝條多伸展，紫褐色，老枝粗壯，小枝無毛；頂芽卵形或長圓狀卵形，鱗片棕色革質，寬圓形，背面無毛，邊緣有小睫毛，上部鱗片邊緣的毛濃密。葉互生；葉柄長 1 ~ 3.5 cm，帶紅色；葉片倒卵形至倒卵狀披針形，長 4.5 ~ 9(~ 13) cm，寬 1.7 ~ 4.2 cm，先端短突尖或短漸尖，基部楔形，革質，上面黑綠色，有光澤，下面較淡，帶粉白。圓錐花序頂生或在新枝上腋生，無毛，具長梗；花兩性；苞片卵形，有棕紅色貼伏絨毛；花被裂片 6，排成 2 輪，長圓形；能育雄蕊 9，花藥 4 室，花絲無毛，第 1、2 輪雄蕊花藥

內向，第 3 輪雄蕊花藥外向，第 4 輪為不育雄蕊，呈箭頭狀；基部有硬毛；雌蕊子房球形，無毛；花柱細長，柱頭頭狀，果扁球形，直徑 8 ~ 10 mm，初時綠色，後變黑紫色；果梗鮮紅色。花期 2 月，果期 7 月。

生於山地闊葉混交林中。分佈於臺灣、中國山東、江蘇、安徽、浙江、江西、福建、湖南、廣東、廣西等地。

【採收加工】

全年均可採，剝取根皮或樹皮，刮去栓皮，洗淨，切段，鮮用或曬乾。

【性味】

味辛、苦，性溫。歸肝、脾、胃經。

【功能】

溫中順氣，舒經活血，消腫止痛。

【主治】

嘔吐腹瀉，小兒吐乳，胃呆食少，扭挫傷，轉筋，足腫。

【用法用量】

內服：煎湯，10 ~ 15 g。

外用：適量，搗敷；或煎湯薰洗。

【使用注意】

孕婦禁服。

職人レベルの粉碎技術

革新的な抽出技術



熱量
<50
每份
大卡



線上購買



- ✓ 快速上桌 免熬煮
- ✓ 無添加防腐劑
- ✓ 總重金屬檢驗合格

濃度 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

辣度 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7



勝昌製藥廠股份有限公司
訂購電話 : 0800-261-099

營運總部:臺北市中正區和平西路二段56號
中壢廠:桃園市中壢區民族路六段436,436-1號

販售通路:
watsons 獨家販售
momo 購物網

中藥飲片炮製介紹 --- 石決明

勝昌製藥品質管理部 魏昌福

前言：

依據《臺灣中藥典》與《中國藥典》記載，石決明藥材來源為鮑科動物雜色鮑 *Haliotis diversicolor* Reeve、皺紋盤鮑 *Haliotis discus hannai* Ino、羊鮑 *Haliotis ovina* Gmelin、澳洲鮑 *Haliotis ruber* Leach、耳鮑 *Haliotis asinina* Linnaeus 或白鮑 *Haliotis laevigata* Donovan 的貝殼；具有平肝潛陽，清肝明目的功效^{1,2}。石決明始載於《明醫別錄》，列為上品。歷代醫家使用的炮製品有石決明、煅石決明、煅石決明、醋石決明、童便製石決明、鹽石決明及地榆製石決明等^{3,4}。現代炮製以石決明及煅石決明較為常用，在此介紹這二種飲片的炮製方法及相關資訊，以供同好參考。

一、炮製方法

1. 石決明：

除去雜質，洗淨，乾燥，碾碎¹⁻⁶。

2. 煅石決明：

取淨石決明置適宜容器內，於無煙的火爐中，用武火加熱，煅至酥脆時取出，放涼，碾碎²⁻⁶。

二、飲片性狀

1. 石決明（圖 1）：

本品為鮑科動物雜色鮑貝殼，呈長卵圓形，內面觀略呈耳形。表面暗紅色，有多數不規則的螺肋和細密生長線，螺旋部小，體螺部大，從螺旋部頂處開始向右排列有 20 餘個疣狀突起，末端 6～9 個開孔，



圖 1 石決明飲片圖 (未碾碎前)



圖 2 煅石決明飲片圖 (未碾碎前)

孔口與殼面平。內面光滑，具珍珠樣彩色光澤。殼較厚，質堅硬，不易破碎。碾碎後的飲片為不規則的碎塊，灰白色，有珍珠樣彩色光澤，質堅硬，氣微，味微鹹^{1,2}。

2. 煅石決明 (圖 2)：

本品形如石決明，灰白色無光澤，質酥脆，斷面呈層狀²。

三、炮製研究

1. 方法與品質研究：

現代炮製研究報導，有學者探討石決明新炮製方法，通過對生品、烘焙品、煅酥品和煅透品 4 個不同炮製品分別作水煎出物、胺基酸煎出率的測定比較。生品煎出率最低；熱處理後煎出率明顯提高。熱處理後，可破壞藥材結構，利於成分煎出。生品含氮量最高，但煎出率最差。煅透品因長時間高溫處理，胺基酸破壞損失近 85%，又因無機鹽雜質大量煎出，阻礙胺基酸

的煎出，故胺基酸煎出率也較差。烘焙品中胺基酸含量破壞約 10%，但煎出率高達 50%。煅酥品各項指標均不及烘焙品。綜合水煎出物和胺基酸煎出率比較，烘焙品胺基酸破壞較少，又利於煎出，優於其他炮製品，故認為烘焙法是石決明的最佳炮製方法，建議石決明炮製品項增加烘焙石決明，並觀察其臨床療效。另外有研究針對傳統煅燒石決明損耗率大的缺陷（約為 25%），提出用文火緩緩煅燒石決明的方法：每 50 kg 石決明，用粗糠鋪平 5 公分厚，石決明堆放其中，以粗糠覆蓋，點燃粗糠，使其緩緩煅燒，此法石決明的損耗率 6~7%⁷。

還有研究報導不同炮製條件對石決明品質有一定影響。石決明煅製品品質優於生品，煅製品中明煅製品以 900°C、1 小時為佳。與相同煅製條件 (900 °C、1 小時) 的明煅品相比，煅淬品的總鈣含量相近，但鹽淬品與醋淬品成分煎出率分別提高 1.6

倍和 4.6 倍，鈣的煎出量，鹽淬品沒有明顯差異，但醋淬品提高 3 倍。本實驗條件下的結果顯示煅淬品優於明煅品，淬液以醋優於鹽水，考慮到輔料對臨床的影響，可根據臨床上的實際情況選擇不同的炮製品。此外有學者研究探討石決明煅製溫度，結合市場調查及傳統經驗對生品及 300 ~ 850 °C 不同煅製品性狀、得率、水煎液 pH、浸出物含量、總鈣及可溶性鈣的比較分析和樣品的 X-Ray 檢測選擇石決明的煅製溫度，結果顯示總鈣含量隨加工溫度提高而上升，經由系統分析結果，石決明以 300 °C 左右煅製為宜⁸。

2. 化學與藥理研究：

石決明來源中雜色鮑的貝殼主含碳酸鈣，並含殼角質及無機物元素鈉、鈣、鉄、錳、鐵、磷、鎂、鋅、銅等；貝殼的內層具珍珠樣光澤的殼角質，經鹽酸水解得 16 種胺基酸，有甘胺酸 (glycine)、天冬胺酸 (aspartic acid)、丙胺酸 (alanine)、絲胺酸 (serine)、麩胺酸 (glutamic acid) 等。另一來源皺紋盤鮑的貝殼含碳酸鈣 90 % 以上，有機質約 3.67 %；無機物元素有鈉、鎂、鋁、矽、鉀、鐵、磷、鉄、錳、銅、鎳、鋯、鋅、氯、硫和碘，其中有磷酸根、矽酸根、硫酸根離子存在；並含膽素和殼角質等³。

現代藥理研究顯示，石決明具有保肝作用。以雜色鮑貝殼內層水解液經小鼠抗四氯化碳急性中毒實驗結果顯示，可使給藥組丙胺酸轉胺酶 (GPT) 較對照組明顯下

降。病理切片觀察給藥組肝細胞幾乎沒有變性。此外，石決明還具有鎮靜、解熱、利尿、加速新陳代謝、中和胃酸、抑制免疫、抗感染、抗凝血及降血壓等作用^{3,10}。

四、臨床應用

1. 功效應用：

中醫理論認為石決明具有平肝潛陽，清肝明目的功效。常用於頭痛眩暈，目赤翳障，視物昏花，青盲雀目。石決明的炮製作用，一般認為生石決明偏於平肝潛陽，煅石決明緩和平肝潛陽的功效，增強了固澀收斂、明目的作用。用於目赤翳障、青盲雀目、痔漏成管。且煅製後質地疏鬆，便於粉碎，有利於有效成分煎出⁴⁻⁷。

在臨床應用上，石決明性味鹹、寒，為平肝潛陽、清肝明目之藥。用於肝陽上亢之頭痛眩暈，耳鳴目脹；每與牡蠣、代赭石、磁石之類重鎮藥同用，以增強平肝潛陽之功；如係肝腎陰虛而致的陽亢，須配生地黃、白芍、枸杞子、龜板等藥，以滋陰潛陽。石決明為清肝明目要藥，用治肝火上炎，目赤腫痛，配菊花、決明子或黃連、車前子，如《聖濟總錄》決明丸；石決明亦可單用石決明細水飛點眼，嚴重者配烏賊骨、琥珀、珍珠、冰片同點，如《聖惠方》石決明散。此外，石決明尚可用於骨蒸潮熱、砂淋澀痛等³。其他常用方劑如天麻鈎藤飲及明目地黃丸等，可隨證加減應用。

2. 用法用量：

內服：煎湯，6～20 g，打碎先煎；或入丸、散^{2,3}。

外用：適量，研末水飛點眼³。

平肝內服宜生用，眼疾外點宜煅用。

使用注意：脾胃虛寒者慎服，消化不良、胃酸缺乏者禁服³。


結語

綜上所述，石決明常見的炮製有石決明及煅石決明二種方法，目的是要提高飲片品質、使質地酥脆與增加成分溶出，以達到安全、均一與有效的用藥要求；在相關的炮製研究顯示，經烘焙的石決明飲片中胺基酸煎出率較高，可保留較高的氨基酸不被破壞，優於石決明生品、煅酥品及煅透品飲片，還有煅後醋淬品可以增加鈣的煎出率，至於煅製時間與溫度兩者需互相配合，才能得到較適合的煅製品，最大的原則為炮製存性，避免煅燒過度；另外藥理研究顯示石決明具有鎮靜、解熱、保肝及降血壓等藥理作用。因此，在臨床應用石決明時，應根據病情病況的需要，選用適宜對證的飲片或處方，才能讓藥物的療效完全發揮並避免不良反應的產生。

參考資料：

- 衛生福利部臺灣中藥典編輯委員會，2021，臺灣中藥典第四版，衛生福利部，頁 111-112。

- 國家藥典委員會，2020，中華人民共和國藥典 2020 年版一部，中國醫藥科技出版社，頁 93。
- 國家中醫藥管理局中華本草編委會，1999，中華本草（九），上海科學技術出版社，頁 36-39。
- 鄭虎占、金護哲，2004，中藥飲片應用與標準化研究，學苑出版社，頁 585-589。
- 葉定江，2002，中藥炮製學，知音出版社，頁 255-256。
- 呂俠卿，1999，中藥炮製大全，湖南科學技術出版社，頁 228-229。
- 金世元、王琦，2004，中藥飲片炮製研究與臨床應用，化學工業出版社，頁 219-222。
- 童承福、2011，臺灣常用中藥材炮製實務彙編，行政院衛生署中醫藥委員會，頁 393-396。



勝昌漢茶 健康首選

無咖啡因、無糖、無香料



生津潤喉

促進代謝

元氣滿分

健康維持

朝氣有神

選擇勝昌的關鍵



研發團隊

中醫藥相關
專業研發團隊
調配最佳風味



逐批檢驗

成分每批檢驗
每批安全
讓您全家都放心!



合格保證

- ✓ 沙門氏菌
- ✓ 重金屬檢驗
- ✓ 食品級農藥殘留檢驗
- ✓ 金黃色葡萄球菌(食品)
- ✓ 單核球增多性李斯特菌

- ① 合格製造工廠
- ② 安心檢驗
- ③ 天然無添加

三大安心
挑選秘訣



勝昌製藥廠股份有限公司

營運總部：臺北市中正區和平西路二段56號

中壢廠：桃園市中壢區民族路六段436,436-1號

免付費服務專線：**0800-261-099**



購物商城



watsons

獨家販售

天麻之本草與現代研究概述(下)

中華民國中醫師公會全國聯合會 邱勇嘉博士

《接續上集》

採收加工與（修治）炮製方法

採收加工相關描述首載於《吳普本草》中，三月、四月、八月採根，日乾，後代典籍也多引用於此^[21]。真正有炮製內容則為《雷公炮炙論》，以蒺藜子做為輔料來炮製，其內容及步驟概述如下：

步驟一：以加熱的蒺藜子作為輔料蓋在天麻上（比例天麻：蒺藜子約為1：0.64）

步驟二：以三種紙密封瓶口，從巳時（上午9點到11點）放置至未時（下午1點到3點）之間。

步驟三：取出蒺藜子，炒熟後再蓋上天麻，密封，放置一天。

步驟四：重複步驟三，共反覆執行七次。

步驟五：第七次後取出天麻，除去天麻表面水氣。

步驟六：切片後焙乾。

步驟七：切細後搗碎，入藥用。

上述炮炙法為歷代典籍中步驟最繁瑣的炮炙方法之一，其餘尚有去皮後燙、煨法、銚碎用等詳如表六^[3, 5, 6, 8, 11, 21, 23, 36]。

歷代本草典籍記載之產地加工與炮製方法現今已鮮少使用，目前主要以蒸製與煮製為主，其主要目的為使藥材軟化利於切片及達到“殺酶保苷”保護活性成分，在《中華人民共和國藥典2020年版》中描述為「立冬後至次年清明前採收，立即洗淨，蒸透，敞開低溫乾燥」。實際上產地加工程式為採收後淨製，蒸透，攤開低溫乾燥，再淨製，潤透或蒸軟，切製成薄片，乾燥即得。整個流程需經過蒸製及乾燥各兩次，才能成為天麻飲片，故在成為飲片之前，天麻經歷了藥材產地加工階段和飲片炮製階段共兩次“水處理-乾燥”過程。由於天麻中含有較多水溶性的有效成分，應減少水的處理以確保其療效^[38-40]。根據南京中醫藥大學單鳴秋博士等專家研究指出將藥材產地加工和飲片炮製簡化成1次

表六、歷代本草典籍採收加工與（修治）炮製內容

典籍名稱	採收加工與（修治）炮製方法
吳普本草	三月、四月、八月採根，日乾。
雷公炮炙論	修事天麻十兩，用蒺藜子一鎰，緩火燉焦熟後，便先安置天麻十兩於瓶中，上用火燉過蒺藜子蓋，內外便用三重紙蓋、並系，從巳至未時，又出蒺藜子，再入燉炒。准前安天麻瓶內，用炒了蒺藜子於中，依前蓋，又隔一伏時後出，如此七遍。瓶盛出後，用布拭上氣汗，用刀劈，焙之，細銼，單搗然用。
新修本草	三月、四月、八月採根，曝乾。
圖經本草	二月、三月、五月、八月內採。初取得，乘潤利去皮，沸湯略煮過，曝乾收之。
經史證類備急本草	五月採根，曝乾。
本草品彙精要	（採）三月四月八月取【收】曝乾【制】銼碎用。
本草害利	三四月採苗，七八月採根。濕紙包，於糠火中煨熟取出，切片酒浸一宿，焙乾用。
本草備要	濕紙包煨熟，切片，酒浸一宿焙用。

的“水處理-乾燥”過程，採收後立即洗淨，再蒸製 30 分鐘後切片置於 60°C 烘箱內乾燥 12 小時，相較傳統的採收加工與炮製方法，可有效保留較多的天麻素 Gastrodin 及巴利森昔 A-E Parishin A-E 等水溶性較高的指標性成分^[41]。另有研究指出使用微波方式以短時間高效破壞分解酶的活性，減少活性成分的流失並增加其溶出率；最佳的乾燥方式為減壓乾燥及冷凍乾燥^[42]。

傳統中醫理論與現代藥理活性

在歷代本草中天麻為性溫，味辛，入肝經，部分典籍記載為性（氣）平，味辛、甘或苦都有，入膀胱鏡、足厥陰、肺、脾、肝、膽、心經等；用途分類與功效上典籍

多將天麻分為平肝潛陽、熄風止痙或祛風通絡藥，經過國內專家學者彙整討論後在《臺灣中藥典第四版》裡記載性味與歸經為「甘，平。歸肝經」，用途分類為「平肝熄風藥」^[43,44]。《神農本草經》中所載之功效為“主殺鬼精物，蠱毒惡氣主急慢驚風”可知天麻在傳統中醫藥上主要用於精神方面的疾病，另在《經史證類備急本草》中提到“主諸風濕痹，四肢拘攣，小兒風癇驚氣，利腰膝，強筋力”，可知天麻亦有改善有抽搐拘攣；眩暈；頭痛；半身不遂；肢麻；風濕痹痛等功效。此外在本草典籍中多數都有記載到“久服益氣力，長陰肥健，輕身增年”，也因此天麻成為常見的食補的原料或現代保健品開發的熱門原料。

現代藥理研究顯示，天麻與天麻中活性成分（天麻素、天麻昔元、香草醛、香草醇、巴利森昔 A-E 及天麻多醣等）具鎮靜催眠、抗驚厥、提升學習記憶能力、保護神經元、抗憂鬱、降血壓、促進血管新生、保護心肌細胞、抗血小板聚集、抗發炎及抗氧化等作用，藥理活性彙整如表七^[45-49]。毒性研究上，天麻為本經上品，且在歷代本草典籍上基本都以“無毒”記載，但在《本草綱目》的赤箭項下有提到“久服天麻藥，遍身發出紅丹者，是其祛風之驗也”，李時珍認為長期服用之後全身浮現出紅色的斑點，是祛風（驅除風邪）的療效表現，以現代醫學角度，全身出現紅斑的情況可能為藥物過敏或其他不良反應的現象，天

麻是否合適所有人長期服用需審慎考量。另在體外和體內遺傳毒性試驗以及 28 天口服毒性結果顯示，天麻的水萃取物（萃取率約為 18.9%）無顯著的致突變或毒性，(no-observed-adverse-effect level, NOAEL) 值為高於 8065 mg/kg bw，換算約等於每公斤服用 42.67 公克的該批天麻藥材，故在正常情況下服用天麻是相當安全的^[50]。

品質管理規範及檢驗規格

基原

《臺灣中藥典第四版》裡記載天麻為蘭科 Orchidaceae 植物天麻 *Gastrodia elata* Blume 之乾燥塊莖，其來源植物和藥用部位與《中華人民共和國藥典 2020 年版》、

表七、天麻與天麻中活性成分之常見藥理活性

中樞神經系統	心血管系統	腎臟
催眠和鎮靜	保護心肌細胞	抑制腎臟炎症和纖維化
抗帕金森氏症	抗高血壓	提高收縮性膀胱平滑肌
抗憂鬱藥	抗血小板聚集和抗血栓形成	骨骼系統
抗驚厥藥	促進血管新生	改善骨質疏鬆
抗眩暈	消化系統	
鎮痛	保護胃黏膜	減少氟化物對骨骼和牙齒的損害
抗癲癇	放鬆迴腸平滑肌	其他
保護神經細胞	改善肝臟病理變化	增強免疫力
阿茲海默症	血糖控制	
改善認知障礙	改善糖代謝、脂質代謝和胰島素抗性	美白
提升血管性失智症病患之生活品質	抑制人類視網膜內皮細胞損傷	抗腫瘤
保護腦缺血再灌注 (I/R) 引起的腦損傷	減少肝醣原輸出	抗老化
		抗菌及抗病毒

《日本藥局方第 18 版》及《韓國藥典第 12 版》相同。

採收加工與炮製

《中華人民共和國藥典 2020 年版》要求天麻應在立冬後至次年清明前採收，並立刻洗淨、蒸熟，再經低溫乾燥處理。《日本藥局方第 18 版》與《韓國藥典第 12 版》則強調濕熱法（煮製或蒸製）與乾燥的過程。相比之下，《臺灣中藥典第四版》僅要求乾燥而對此未另做具體規範。

外觀性狀與顯微鑑別

各國藥典均有外觀性狀規範，針對其外部性狀特徵要求，如顏色、紋理及質地，以確保來源的正確性，《臺灣中藥典第四版》、《中華人民共和國藥典 2020 年版》及《韓國藥典第 12 版》另有顯微鑑別的規範。

TLC 薄層層析

《臺灣中藥典第四版》與《中華人民共和國藥典 2020 年版》同時使用對照藥材及對照標準品（天麻苷），《韓國藥典第 12 版》使用對照藥材，《日本藥局方第 18 版》僅以 R_f 值（0.4）作為依據。

含量檢測

各國藥典皆有稀乙醇抽提物的規範，而《臺灣中藥典第四版》另有水抽提物規範；品管指標的定量，《臺灣中藥典第四版》以天麻苷計算不得少於 0.2%，《中華人民共和國藥典 2020 年版》與《韓國藥典第 12 版》皆是以天麻苷和對天麻苷元之總和計算分別不得少於 0.25% 及 0.2%，在《日

本藥局方第 18 版》中則無此項規範。

雜質檢查及其他規定

各國藥典對雜質檢查的要求也存在差異，《韓國藥典第 12 版》的規範最為嚴謹，包含灰分、重金屬、二氧化硫與農藥殘留等，尤其是二氧化硫限量 30 ppm 及 DDT、BHC、Aldrin、Endrin 等農藥殘留的限量規範，《臺灣中藥典第四版》與《中華人民共和國藥典 2020 年版》則缺少農藥殘留的規範，而《日本藥局方第 18 版》相較下在安全性上的規範較少。

貯藏法

儲藏條件在各國藥典中也有所不同，《臺灣中藥典第四版》要求冷藏或置於陰涼乾燥處，並應防黴，應與臺灣地處亞熱帶海島型氣候具高溫高濕之特性有關。《中華人民共和國藥典 2020 年版》中要求置通風乾燥處，防蛀。《日本藥局方第 18 版》及《韓國藥典第 12 版》內容相對簡單僅要求密閉貯藏，不過日、韓藥典在通則處已先說明所有藥材皆要防蟲、鼠及防潮以避免變質。

不同藥典對天麻的規範，反映出各國對中藥材品質與安全性的要求不同。臺灣與韓國在安全性方面的規範較為詳細，顯示出對藥材安全性的高度重視。中國則對天麻的含量標準及成分較為嚴格，確保藥材的有效成分達到藥效要求。日本在規範上相對簡單，偏重於基本檢驗要求，其詳細比較表詳如表八。

表八、臺灣、中華人民共和國、日本及韓國藥典中天麻規格比較表

		臺灣中藥典第四版	中華人民共和國藥典 2020 年版	日本藥局方第 18 版	韓國藥典第 12 版
基原		蘭科 Orchidaceae 植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Blume 之乾燥塊莖			
採收加工與炮製		無	立冬後至次年清明前採挖，立即洗淨，蒸透，敞開低溫乾燥。	熱水燙製或蒸製	蒸製與乾燥
鑑別	性狀	有	有	有	有
	顯微鑑別	有	有	無	有
	TLC 薄層層析	天麻苷及對照藥材	天麻苷及天麻對照藥材	比對 <i>Rf</i> 值 (約 0.4)	天麻對照藥材
含量	HPLC 檢測	天麻苷不得少於 0.2%。	1. 呈現 6 個特徵峰，並應與對照藥材參照物色譜中的 6 個特徵峰相對應，其中峰 1、峰 2 應與天麻素對照品和對羥基苯甲醇對照品參照物峰保留時間相一致。 2. 天麻素和對羥基苯甲醇的總量不得少於 0.25%。	無	天麻苷和對天麻苷元的總量不得少於 0.2%。
	水抽提物	18.00%	無	無	無
	稀乙醇抽提物	14.00%	15.00%	16%	17.0%.
雜質檢查及其他規定	乾燥減重 / 水分	無	15.00%	16%	13%
	總灰分	4.00%	4.50%	4%	無
	酸不容灰分	0.50%	無	無	無
	二氧化硫	400 ppm	400 ppm	無	30 ppm
	砷 (As)	5.0 ppm	無	無	3.0 ppm
	鎘 (Cd)	1.0 ppm	無	無	0.3 ppm
	汞 (Hg)	0.2 ppm	無	無	0.2 ppm
	鉛 (Pb)	5.0 ppm	無	10.0 ppm	5.0 ppm
農藥殘留		無	無	無	(1) Total DDT (sum of p, p'-DDD, p, p'-DDE, o, p'-DDT and p, p'-DDT): 0.1 ppm. (2) Dieldrin: 0.01 ppm. (3) Total BHC (sum of α, β, γ and δ-BHC): 0.2 ppm. (4) Aldrin: 0.01 ppm. (5) Endrin: 0.01 ppm.
貯藏法		應冷藏或置於陰涼乾燥處，並應防黴。	置通風乾燥處，防蛀。	密閉貯藏	密閉貯藏

註：天麻苷即天麻素；對羥基苯甲醇即天麻苷元。

結語

採隨著臺灣人口老化現象日益加劇，根據國發會資料顯示臺灣已邁入高齡社會，65 歲以上老年人口佔比持續上升，預計於 2025 年底將進一步進入超高齡社會。老年人口的增加使失智症、帕金森氏症、中風、頭暈及失眠等神經退行性疾病日益普遍，對於具有調節神經與保護、改善腦部功能之中藥材「天麻」的需求可能隨之而增加。在臺灣，天麻不僅是中醫醫療中常用的中藥材，也被衛生福利部食品藥物管理署列為可供食品使用的原料，故需求量相當可觀。根據財政部關務署的統計，自民國 92 年至 112 年間，臺灣每年從國外進口天麻平均達 61.31 公噸。由於科技不斷的進步及氣候環境的變遷，傳統道地藥材的產區、土壤性質與氣候條件已不再與過去相同，道地產區的藥材品質未必是最佳選擇。同樣地，傳統的採收加工與炮製方法也未必永遠是最理想的作法，因此需要以科學方法探索符合現代規範、成本效益及環境友善的優質產區及採收加工與炮製方法。此外，供應端必須注意中藥材與食品在法規上的不同，以免因混淆而導致違規或受罰；末端消費者則需先諮詢合格中醫師及購買來自合格供應商提供的產品。

參考資料：

36. 雷敷，《雷公炮炙論》，中國哲學書電子化計劃。

<https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=442246>

37. 周碧乾、齊路明、馬雲桐、裴瑾，天麻初加工方法對主要成分含量的影響及加工方法的化學模式識別 [J]，天然產物研究與開發，2018，30(5)：736-743、869。
38. 楊濱，中草藥加工技術 [M]，北京：中央廣播電視大學出版社，2009：53。
39. 國家藥典委員會，中華人民共和國藥典：一部 [S]，北京：中國醫藥科技出版社，2020：60-61。
40. 單鳴秋、錢岩、于生、張麗、丁安伟，基於回應面法的天麻產地加工炮製一體化工藝研究 [J]，中草藥，2016，47(3)：420-424。
41. 張瑋瑋、鄭司浩、王永輝、王偉、張志鵬、蔡翠芳，不同乾燥和炮製方法對天麻品質的影響 [J]，世界科學技術：中醫藥現代化，2020(4)：1278-1284。
42. 朱豔玲、郭瑞華，天麻四性變遷的本草考證 [J]，山東中醫藥大學學報，2011，35(5)：423-425。
43. 衛生福利部臺灣中藥典第四版編修委員，臺灣中藥典第四版，衛生福利部，2021：51-52。
44. Sun X, Jia B, Sun J, et al. *Gastrodia elata* Blume: A review of its mechanisms and functions on cardiovascular systems. *Fitoterapia*. 2023;167:105511.
45. Wu YN, Wen SH, Zhang W, et al. *Gastrodia elata* BI.:A Comprehensive Review of Its

- Traditional Use, Botany, Phytochemistry, Pharmacology, and Pharmacokinetics. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2023;2023:5606021.
46. Liu Y, Gao J, Peng M, Meng H, Ma H, Cai P, Xu Y, Zhao Q and Si G (2018) A Review on Central Nervous System Effects of Gastrodin. *Front. Pharmacol.* 9:24.
47. 于涵、張俊、陳碧清、黃紅、李召輝、黃世偉、李小雪、劉新民、呂光華，天麻化學成分分類及其藥理作用研究進展 [J]，中草藥，2022，53(17)：5553-5564。
48. Yang L, Qin SH, Zi CT. Research progress of *Gastrodia elata* Blume polysaccharides: a review of chemical structures and biological activities. *Front Chem.* 2024;12:1395222.
49. Lu KH, Ou GL, Chang HP, Chen WC, Liu SH, Sheen LY. Safety evaluation of water extract of *Gastrodia elata* Blume: Genotoxicity and 28-day oral toxicity studies. *Regul Toxicol Pharmacol.* 2020;114:104657.
50. THE MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE, Japanese Pharmacopoeia 18th Edition , 2021
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku/seisaku-1000000/000912390.pdf>
51. Korea Food and Drug Administration, Korean Pharmacopoeia (Twelfth Edition) , 2024
https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_18/view.do?seq=71538

漢方植萃

美肌保養

蜂膠控油洗髮精



燕窩水潤沐浴露

勝昌購物商城



勝昌製藥廠股份有限公司中壢廠
 臺北市中正區和平西路二段56號
 桃園市中壢區民族路六段436號
 訂購電話 : 0800-261-099



勝昌製藥四度共襄大甲媽遶境

漢方花車護航九天八夜進香之路

勝昌製藥事業開發處 彭郁婷

臺灣年度宗教盛事「大甲媽祖遶境」於 2025 年 4 月 4 日隆重起駕，揭開九天八夜、超過 340 公里的徒步進香旅程序幕。這場融合信仰、文化與臺灣在地精神的活動，不僅吸引數十萬香燈腳追隨媽祖步伐，更成為企業展現社會責任與文化關懷的重要平台。今年已連續第四年參與遶境的國內中藥製劑領導品牌「勝昌製藥」，再度以實際行動與信眾同行，不僅打造全臺唯一「漢方花車」並於媽祖駐駕奉天宮期間，於宮前發送勝昌金門一條根貼布，幫助香燈腳走得更遠、更健康。

大甲媽祖遶境歷史沿革

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動可追溯至清朝雍正 8 年，始於福建湄洲的進香活動，當時從大安港或溫寮港直接駛往湄洲，約每十二年舉辦一次。一直延續至日治時期，因臺中大安港廢港，臺灣與福建的交通中斷，前往湄洲進香活動因此停擺。而後因常往返大甲與北港從事貿易，大甲媽祖轉

而改赴北港朝天宮進行「割火進香」，直到民國 77 年，鎮瀾宮正式將遶境目的地改為新港奉天宮。從原本的四天三夜延長至八天七夜，最後定為九天八夜的完整行程，貫穿臺中、彰化、雲林、嘉義等中部四個縣市，橫跨 21 個鄉鎮市區，行經近百座廟宇，全程往返超過 300 公里，此一傳統盛事於民國 97 年被文化部指定為「國家重要無形文化資產」。



大甲鎮瀾宮



新港奉天宮

由神轎班人員抬起媽祖鑾轎，恭請媽祖起駕遶境進香，正式展開遶境之行。

六、「駐駕典禮」—媽祖鑾轎抵達新港奉天宮時，媽祖神尊離轎登殿安座，感謝媽祖庇佑全體人員平安抵達新港。

七、「祈福典禮」—媽祖駐駕後的隔日清晨五時在奉天宮大殿舉行祈福儀式，祈求媽祖賜福眾生。

八、「祝壽大典」—繼祈福典禮後，於上午八時舉行，由信眾齊為天上聖母祝壽、誦經讀疏，行三跪九叩禮表達敬意。

九、「回駕典禮」—再度恭請媽祖登鑾轎，啟程返回大甲鎮瀾宮。

十、「安座典禮」—最終，在九天八夜的長程即將落幕之際，媽祖回到鎮瀾宮登殿入座，信眾叩謝媽祖庇佑，為年度盛事畫下圓滿句點。

遶境進香儀式流程

大甲鎮瀾宮遶境為期九天八夜，除了固定的徒步與駐駕外，整個遶境活動自元宵節起，依序有著十項重要的儀式及典禮。

一、「筊筶典禮」—於元宵節當日下午六時，在大殿擲筊決定啟程日期與時間。

二、「豎旗典禮」—豎起頭旗，宣告遶境進香之各項活動正式展開。

三、「祈安典禮」—出發前一天下午三時舉行，祈求媽祖庇佑全體人員平安順利。

四、「上轎典禮」—出發前一天下午五時舉行，恭請天上聖母登上鑾轎，準備啟程。

五、「起駕典禮」—出發當日凌晨零時，



乙巳年大甲鎮瀾宮遶境進香祝壽大典

遶境進香陣頭順序

每年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動展開時，陣頭隊伍依循順序排列，皆有其特定的象徵意涵與職責，最前方為**報馬仔**－作為隊伍的先鋒，負責探路與回報路況，沿途會敲鑼示意，提醒地方信眾與廟主準備迎接媽祖。接續的是**頭旗與頭燈**，頭旗負責引導隊伍的前進方向，三仙旗中間的黃色旗幟代表媽祖，兩側藍色旗幟為護駕，而頭燈象徵視野與光明。

緊隨其後的是**開路鼓**，開路的小型樂隊，邊行進邊吹奏敲擊，預告繞境隊伍即將抵達。之後是**駕前隊伍**，每年元宵節擲筊決定啟程日期後，協調決定頭香、二香、參香、贊香等團體，擁有優先參拜之權利。

接著為以女性香客為主的**繡旗隊**－每年元宵節晚上開放登記報名，平均約有 300 人。**福德彌勒團**由土地公、玉女和三位羅

漢組成，土地公手持元寶象徵福添財。緊接而來的**彌勒團**以三位彌勒佛組成，耳大臉圓，沿途嘻笑飲酒、傳遞歡樂氣氛。

在**太子團**中，三太子哪吒為主神，濟公師父伴隨左右，不少信徒會向太子團討奶嘴，祈願家中新生兒平安長大。隨後的**神童團**由兩位神童組成，為信徒祈求財富、招財進寶。

哨角隊使用長約 145 公分、黃銅鑄造的哨角，根據前方鑼聲指示吹奏，負責開路及驅邪避煞。**莊儀團**為媽祖首席護駕千里眼與順風耳，相傳手上握著的手錢可以避邪。而**三十六執事隊**是繞境中最具武裝感的隊伍，由男性香客組成，手持執事牌與各式兵器，擔負開路與護駕的職責。接著的**轎前吹**為媽祖鑾轎前的小樂班，由嗩吶、吊鼓、鉸、小木魚等樂器合奏。

馬頭鑼為兩面鑼，擔任媽祖停駕或起轎時的敲擊。**涼傘**則源於古代帝王出巡所



左至右分別為：報馬仔、開路鼓及媽祖轎前的涼傘。



用的華蓋，為媽祖沿途遮陽、歇息之用。令旗位於媽祖鑾轎兩側，有鎮煞驅魔之用。核心的媽祖鑾轎由藤編轎身與木雕底座構成，信眾爭相「鑽轎腳」祈求平安、驅病除厄。自行車隊身為交通整隊組，整齊畫一，極富朝氣。

勝昌製藥四度隨行大甲媽祖遶境

每年農曆三月，天空總被一股虔誠與熱情所點燃。大甲鎮瀾宮媽祖遶境全程長達九天八夜，橫跨臺中、彰化、雲林、嘉義四縣市的徒步進香之旅，終點位於嘉義縣新港鄉新港奉天宮，去程駐駕廟宇依序為彰化南瑤宮、西螺福興宮；返程駐駕廟宇依序為西螺福興宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮，來回徒步長達 340 公里，已成為臺灣最具代表性的宗教文化

盛事之一，不僅吸引數十萬信眾參與，「媽祖遶境」更被 Discovery 頻道列為世界三大宗教盛事之一。

在這場融合信仰、文化與臺灣在地精神的活動中，國內中藥製劑領導品牌「勝昌製藥」今年一樣不缺席，連續第四年參與遶境，展現企業對於傳統文化的尊重與對社會的關懷。今年勝昌製藥再度以實際行動與信眾同行，不僅打造全臺唯一的「漢方花車」隨行，花車視覺設計強化品牌標誌，以「媽祖保平安·勝昌助健康」為主題，並重點呈現旗下明星商品「勝昌固關四珍 PLUS+」、「勝昌金門一條根貼布」，希望藉由草本力量守護國人健康，與媽祖慈悲為懷的精神相互呼應。

一條根貼布，香燈腳的最佳後援

臺灣外銷日本第一的中藥品牌－「勝昌製藥」，為國內首家通過三階段確效查核的中藥濃縮製劑廠，始終秉持「人命至重」的精神，與媽祖普渡眾生的理念一致，透過參與媽祖遶境活動，致力於推廣新漢



方養生理念，也讓品牌精神與臺灣最根深蒂固的信仰文化產生共鳴。

為了給予香燈腳最實質的幫助，勝昌製藥今年也加碼在大甲媽祖駐駕奉天宮期間，於宮前以及中途點心站設立派樣點，發放人氣商品「勝昌金門一條根貼布」，添加金門在地小農種植一條根，成分道地，真材實料，協助香燈腳舒緩疲勞，走得更穩、更遠。藉由這樣的行動，不僅傳遞品牌理念與產品價值，更實際參與在信眾的遶境旅程中，讓草本的力量走入信仰現場，陪伴每一步的前行。

與神同行，是信仰，更是承諾

大甲媽祖遶境，不只是宗教儀式，更是臺灣文化與人民心靈的總體展演。每一年的遶境都是一場重塑信仰的旅程，而勝昌製藥選擇以自身的專業與關懷，與信眾肩

並肩同行，代表的不僅是企業參與，更是一份對這片土地、對這些腳步的深刻承諾。

未來，勝昌製藥將持續深耕草本健康領域，不僅致力於提供高品質的中藥產品，也會以草本之力積極參與各項社會公益與信仰盛事，實踐企業使命，將「健康是最大的福氣」這句話，落實在每一次與人群的接觸之中。

參考資料：

1. 財團法人大甲鎮瀾宮全球資訊網
http://www.dajiamazu.org.tw/content/about/about05_01.aspx
2. 財團法人大甲鎮瀾宮遶境進香網站
<https://active.dajiamazu.org.tw/>
3. 內政部 - 臺灣宗教文化地圖
https://taiwangods.moi.gov.tw/html/landscape/1_0011.aspx?i=39



勝昌製藥廠漢方花車，護航大甲媽祖遶境

陣容堅強開發團隊

國際認證實驗室

TAF和TFDA ISO/IEC17025實驗室雙重認證



勝昌檢驗中心在中藥領域具有數十年的檢驗經驗，並通過「財團法人全國認證基金會（TAF）」及「衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）」的認證，符合ISO/IEC 17025國際標準，可出具有公信力的檢驗報告。

專業

提供專業的諮詢
及可靠、精確、快速
高品質的檢驗服務

誠信服務

以誠信及公正為原則
值得客戶信賴的
第三方檢驗機構

公信認證

通過TAF及TFDA
ISO/IEC 17025
實驗室認證




勝昌製藥廠股份有限公司

SHENG CHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

地址：桃園市中壢區民族路六段436號
檢驗諮詢：03-490-9682 #874
傳真：03-420-1998
網址：<http://www.herb.com.tw>



● 農藥殘留檢驗(GC/MS/MS)



● 藥材基原鑑定(組織切片)



● 個別重金屬檢驗(ICP-MS)




● 黃麴毒素檢驗(HPLC)

勝昌檢驗中心服務項目



一、藥材基原鑑定：

組織切片、粉末鏡檢



二、定性分析：

TLC鑑別

三、定量分析：

指標成分含量分析 (HPLC) — 臺灣中藥典第四版-定量成分

精油含量測定

四、異常物質檢測：

總重金屬 (以鉛計)

個別重金屬 (ICP-MS) — 鉛、鎘、汞、砷、銅

黃麴毒素 (HPLC) — Aflatoxin (B₁、B₂、G₁、G₂)

農藥殘留 — 有機氯劑 (總DDT、總BHC、總PCNB)

二氧化硫 (SO₂)

五、微生物檢驗：

好氧性微生物總數、大腸桿菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、

綠膿桿菌、黴菌及酵母菌總數

六、其他：

五大項檢驗 — 水分、總灰分、酸不溶性灰分、水抽提物含量測定、

稀乙醇抽提物含量測定

塑化劑 — DMP、DEP、DIBP、BBP、DBP、DEHP、DNOP、

DINP、DIDP



勝昌製藥廠股份有限公司

SHENG CHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

地 址：桃園市中壢區民族路六段436號

檢驗諮詢：03-490-9682 #874

傳 真：03-420-1998

網 址：<http://www.herb.com.tw>


終於隨香成行， 勝昌願以腳步報恩

勝昌製藥事業開發處 潘昶佑

每年春天，白沙屯媽祖與山邊媽祖都會攜手，與數萬香燈腳徒步前往北港（朝天宮）進香，橫跨中部平原的各大鄉鎮角落，及不固定的進香路線，讓今年吸引了史無前例的 32 萬信眾參與報名，儼然成為臺灣最具代表性的宗教盛事之一。這不僅展現媽祖信仰的力量，也見證人們精神與感動的瞬間，形成臺灣獨特且極具特色的人文風景與信仰文化。

勝昌製藥自 2022 年起，與大甲媽祖結緣，開啟了我們與媽祖同心感恩向前的信仰之路，今年勝昌同仁更參與了白沙屯媽祖北港徒步進香，除了勝昌小編 5/5 ~ 5/6 徒步跟隨媽祖從雲林斗六市走至南投民間鄉（約 36 公里），也於 5/11 回鑾日，陳伯宸董事長、陳恩緒營運長及事業開發處同仁於拱天宮牌樓前，發贈結緣品，慰勞一路辛苦與感恩前行的香燈腳們。

今年白沙屯媽祖進香最令人印象深刻的事情，在於媽祖踏上了 200 年曾未進入的南投縣！5/6 當日午後媽祖的路線就備受關注，尤其南投竹山鎮與彰化二水鄉的



信眾跟隨白沙屯媽祖徒步進香

交叉路口時，兩位媽祖躊躇不前 10 多分鐘後，轉向彰雲大橋的彰化二水鄉前進，就當大夥猜測可能後續路線與往年相同時，媽祖往上往水森路方向轉向，一路朝向源泉派出所（彰化二水花旗木鐵道前）前進，道路的盡頭左方是往彰化二水，右邊則是前往南投名間鄉，此時此刻眾人欣喜若狂，非常期待兩位媽祖會如何決定，鑾轎最終朝向南投名間鄉前進，這不僅是讓每位香燈腳感動落淚，也讓發放福食的愛心夥伴們措手不及。當日最終駐駕於南投松柏嶺受天宮，這間廟宇也別有意義，因為廟的位置剛好在彰化、南投的交界，可見媽祖的用心與慈悲的一面，無論新與舊，大家

都是媽祖喜愛的那片土地。

白沙屯媽祖此次北港進香，勝昌製藥陳伯宸董事長、陳恩緒營運長及事業開發處同仁也於 5/11 回鑾當日，發放勝昌一條根精油貼布、梅桂仙查丸、MAMORI 軟喉糖等，為香燈腳提供元氣！雖然天空下著大雨，但沒澆不熄我們跟隨媽祖的決心。

今年的白沙屯媽祖進香，勝昌感謝粉絲們、通路夥伴們在 5/5 下午兩點、5/6 早上六點半，一路收看我們的直播！在烈日下我們願意代替你的雙腳，與粉紅超跑一同前行，也因為這個直播，讓很多粉絲知道我們都是玩真的，公司裡也充滿著被媽祖懷抱的氛圍，其實每個人態度對了無論進



感謝幸福白糖稞點心站協助發贈結緣品 - 勝昌金門一條根貼布

香還是繞境，無論白沙屯還是大甲媽，你在路途上都會感受到媽祖對你 / 妃的疼惜。

過去，我們跟隨媽祖的行動總是默默前行，也因為大家的支持和鼓勵，今年我們將整個過程呈現給大家，一直以來我們都希望用最接地氣的方式，與大家一起打拼中藥產業。如今追隨媽祖也告一段落，勝昌很感謝白沙屯媽祖、山邊媽祖、大甲媽祖對我們的庇佑，我們也會繼續秉持嚴謹製藥精神，用家人的關愛救人濟世。感謝幸福白糖粿愛心團隊、找廟公團隊與勝昌製藥一起發送愛心福品，提供大家最直接的行動補給！最後我們想對大家說，其



發贈結緣品慰勞辛苦的香燈腳們

實每個人態度對了無論進香還是繞境，無論白沙屯還是大甲媽，您在隨行的上，都會感受到媽祖對您的疼惜。



數十萬信眾追隨媽祖進香



媽祖 200 年來首度前往南投

藥品分級面面觀

日期：114年5月9日

資料來源：食品藥物管理署／藥物食品安全週報第1025期

大家是否曾經發現，當在醫院看完醫生後，領到的藥品在家附近的藥局卻買不到？為什麼有些可以在藥局買到的藥品，卻在便利商店無法購得？這是因為藥品種類繁多，為更有效地管理藥品並保障病人的用藥安全，因此我國制定了藥品分級制度。

一起來了解藥品分級

依照藥品使用的風險，藥品分為：「處方藥」、「指示藥」和「成藥」。其中，處方藥是需要醫師診斷後開立處方箋的藥品；而非處方藥則是不需醫師開立處方箋的藥品，包括指示藥與成藥。

處方藥

「處方藥」是指必須由醫師根據病情診斷後，開立處方箋，再由藥事人員調劑、供應並指導使用的藥品。藥品包裝上會標示「須由醫師處方使用」或「限由醫師使用」。處方藥的藥性通常較強，風險性較高，例如抗生素等藥品，這些藥品只能由處方箋上所列的病人使用。

非處方藥

非處方藥包括兩種類型：「指示藥」和「成藥」。

至於成藥，其藥性更為溫和，使用前不需要醫師診斷，也不需藥事人員指導。

然而，購買時仍需注意藥品的使用說明與標示。成藥的包裝會分為「甲類成藥」和「乙類成藥」兩種。

甲類成藥只能在藥局或零售藥商購買，雖然藥性較為溫和，但使用時仍需遵循標示的用法和用量，例如浣腸藥。乙類成藥的用藥安全性更高，可以在百貨店、雜貨店等一般通路及網路購買，例如某些外用軟膏、清涼劑等。

另特別提醒，切勿任意於網路購買來路不明、標示不清、誇大療效或未經我國核准的藥品，如對於自身用藥有任何問題，可洽詢醫師或藥師，確保用藥安全及維護自身健康。



圖片來源：藥物食品安全週報第1025期

勝昌藥品成方 GMP 製劑要覽

一、濃縮方劑	F05110 四物湯	F09190 茴桂朮甘湯	F12070 草薢分清飲	二、錠劑
F01010 乙字湯	F05120 四逆散	F09200 香芎湯	F12080 越婢加朮湯	CT03040 三黃瀉心湯
F01020 一貫煎	F05130 四逆湯	F09210 香砂六君子湯	F12090 越鞠丸	CT04020 五苓散
F02020 九味羌活湯	F05280 四神丸	F09220 香砂養胃湯	F12100 黃芩湯	CT04120 天王補心丹
F02030 二朮湯	F05140 左歸丸	F09230 香蘇散	F12110 黃耆五物湯	CT05270 安中散
F02040 二陳湯	F05150 平胃散	F09240 香砂平胃散	F12120 黃耆建中湯	CT07110 防己黃耆湯
F02050 人參肥兒丸	F05320 平肝流氣飲	F09300 香薷飲	F12130 黃連上清丸	CT09110 柴胡疏肝湯
F02060 人參敗毒散	F05160 正骨紫金丹	F10220 神秘湯	F12150 黃連湯	CT10080 桂枝湯
F02070 人參養榮湯	F05170 玉女煎	F10010 射干麻黃湯	F12160 黃連解毒湯	CT12040 疏經活血湯
F02080 八仙湯	F05180 玉屏風散	F10030 桂枝加朮附湯	F12170 鈎藤散	CT12160 黃連解毒湯
F02090 八正散	F05310 玉泉丸	F10040 桂枝加芍藥湯	F13010 復元活血湯	CT13170 葛根湯
F02100 八味地黃丸	F05190 甘麥大棗湯	F10050 桂枝加龍骨牡蠣湯	F13060 滋陰降火湯	CT17010 濟生腎氣丸
F02110 八味地帶下方	F05200 甘露消毒丹	F10060 桂枝芍藥知母湯	F13070 滋腎明目湯	CM02100 八味地黃丸
F02120 八珍湯	F05210 甘露飲	F10070 桂枝茯苓丸	F13080 滋腎通耳湯	CM04070 六味地黃丸
F02130 十六味流氣飲	F05220 生化湯	F10080 桂枝湯	F13020 愈帶丸	CM05030 加味道遙散
F02140 十全大補湯	F05230 生成散	F10090 桃紅四物湯	F13030 溫清飲	CM05060 半夏鴻心湯
F02150 十味香薷飲	F05240 白虎加人參湯	F10100 桃核承氣湯	F13040 溫經湯	CM07050 蒲地黃丸
F02160 十味敗毒湯	F05250 白虎湯	F10110 桑菊飲	F13050 溫膽湯	CM07120 防風通聖散
F02170 十神湯	F05260 白頭翁湯	F10120 桑螵蛸散	F08090 當歸散	CM08050 知柏地黃丸
F02180 七寶美髯丹	F05270 安中散	F10130 枯梗湯	F13090 當歸六黃湯	CM10070 桂枝茯苓丸
F02190 七物降下湯	F05290 瓜蔞枳實湯	F10140 消風散	F13100 當歸四逆湯	CM10100 桃核承氣湯
F16070 七味白朮散	F06010 托裏消毒飲	F10150 消痔丸	F13110 當歸芍藥散	CM11030 參苓白朮散
F03020 三痹湯	F06020 百合固金湯	F10170 蘿藥順氣散	F13120 當歸拈痛湯	CM11240 遙逍散
F03030 三黃石膏湯	F06030 竹葉石膏湯	F10180 益血力	F13130 當歸飲子	CM11270 麻子仁丸
F03040 三黃瀉心湯	F06060 竹茹溫膽湯	F10190 益氣聰明湯	F13140 當歸龍薈丸	CM13190 補中益氣湯
F03050 上中下通用痛風丸	F06040 血府逐瘀湯	F10200 真人活命飲	F13150 慢愈湯	CM14030 酸棗仁湯
F03060 大承氣湯	F07010 吳茱萸湯	F10210 真武湯	F13160 葛花解醒湯	CM16030 獨活寄生湯
F03070 大青龍湯	F07020 抑肝散	F10230 泰艽鱉甲散	F13170 葛根湯	CM16080 龍膽鴟肝湯
F03080 大建中湯	F07030 折衝散	F10240 茯菟丹	F13180 葛根黃連黃芩湯	CM17030 還少丹
F03090 大柴胡湯	F07040 杏蘇散	F10250 茵陳五苓散	F13190 補中益氣湯	CM18020 歸脾湯
F03100 大秦艽湯	F07050 蒲地黃丸	F10260 茵陳蒿湯	F13210 補陽還五湯	CM20010 蕤香正氣散
F03110 大黃牡丹皮湯	F07060 蒲藥甘草湯	F10270 荆防敗毒散	F13260 補陰陽	三、膠囊劑
F03220 大柴胡湯去大黃	F07070 苓藥湯	F10280 蒲荊連翹湯	F13220 過期飲	CH04070A 六味地黃丸
F03120 女科柏子仁	F07080 莩薢膠艾湯	F11030 參苓白朮散	F13230 頭暈湯	BC12210A 黃連
F03130 小半夏加茯苓湯	F07090 辛夷清肺湯	F11040 參蘇飲	F13240 寧嗽丸	四、傳統丸劑
F03140 小承氣湯	F07100 辛夷散	F11050 故脾丸	F14010 槐花散	W02100 八味地黃丸
F03150 小青龍湯	F07110 防己黃耆湯	F11060 強腎	F14020 蒼耳散	W02140 十全大補丸
F03160 小建中湯	F07120 防風通聖散	F11080 排膿散	F14030 酸棗仁湯	W04050K 五子種玉丹
F03170 小活絡丹	F07130 完帶湯	F11090 涼膈散	F14040 銀翹散	W04070 六味地黃丸
F03180 小柴胡湯	F07150 身痛逐瘀湯	F11130 涼膈散去硝黃加桔梗	F14050 鼻瘺	W04120 天王補心丹
F03190 小陷胸湯	F07170 沙參麥冬湯	F111100 清上防風湯	F14060 脊下逐瘀湯	W05110 四物丸
F03200 小續命湯	F08010 兒科杏蘇散	F11110 清上蠲痛湯	F15010 濁腸湯	W05140 左歸丸
F03230 小柴胡湯去參	F08020 定喘湯	F11120 清心蓮子飲	F15020 調胃承氣湯	W07190K 延年回春丹丸
F03240 小蘄飲子	F08140 定志丸	F11130 清空膏	F15030 調經丸	W07050 蒲地黃丸
F03210 川芎茶調散	F08030 治癥固本丸	F11140 清肺湯	F15040 養心湯	W08050 知柏地黃丸
F04010 五皮飲	F08040 炙甘草湯	F11150 清肺飲	F15050 養肝丸	W08100 金鎖固精丸
F04020 五苓散	F08050 知柏地黃丸	F11160 清胃散	F15060 養陰清肺湯	W11390 捷豹健步丸
F04030 五淋散	F08060 烏牽勝瀝湯	F11190 清暑益氣湯	F16060 豬苓湯	W11400 麥味地黃丸
F04040 五積散	F08070 金水六君煎	F11200 清燥救肺湯	F16010 導水茯苓湯	W12180K 雜斑丸
F04060 六君子湯	F08080 金沸草散	F111380 清心利膈湯	F16020 導赤散	W16080 龍膽鴟肝丸
F04070 六味地黃丸	F08100 金鎖固精丸	F11210 理中湯	F16030 獨活寄生湯	W16090K 龜鹿二仙丸
F04080 六和湯	F08110 附子理中湯	F111350 理冠丹參散	F16080 蒼草根牡蠣湯	W17010 濟生腎氣丸
F04090 分消陽	F08120 定喘湯	F11220 紫草根牡蠣湯	F16090 龜鹿二仙膠	W17030 還少丸
F04100 升陽益胃湯	F09010 保元柴胡清肝散	F11230 紫苑湯	F17010 濟生腎氣丸	五、傳統散劑
F04110 升麻葛根湯	F09020 保安腎	F11240 遙逍散	F17020 意苡仁湯	CS03150H 小青龍湯散
F04120 天王補心丹	F09030 保和丸	F11250 連翹敗毒散	F17030 還少丹	CS06070C 行血運功散
F04180 天麻鈞藤飲	F09040 保產無憂方	F11260 麥門冬湯	F18010 輾齒散	CS11320C 健胃散
F04130 木防已湯	F09050 厚朴溫中湯	F11400 麥味地黃丸	F18020 蒼耳散	CS11320F 健胃散
F04140 木香檳榔丸	F09060 枳縮二陳湯	F11270 麻子仁丸	F18030 白瀉散	CS11320H 健胃散
F04160 止嗽散	F09070 柴胡加龍骨牡蠣湯	F11280 麻杏甘石湯	F18040 滌黃散	CS13170H 葛根湯散
F04170 少腹逐瘀湯	F09080 柴胡桂枝湯	F11290 麻杏薏甘湯	F18050 雙解散	
F05010 旋覆代赭石湯	F09090 柴胡桂枝乾薑湯	F11300 麻黃湯	F20010 蕤香正氣散	
F05020 加味平胃散	F09100 柴胡清肝湯	F11310 麻黃附子細辛湯	F20020 蘆子降氣湯	
F05030 加味道遙散	F09110 柴胡疏肝湯	F11370 通竅活血湯	F21010 繢命湯	
F05040 夏半麻白朮湯	F09130 柴陷湯	F12030 疏肝湯	F21020 驅風解毒湯	
F05050 夏半厚朴湯	F09140 柴葛解肌湯	F12040 疏經活血湯	F21040 聲破笛丸	
F05060 夏半瀉心湯	F09150 洗肝明目湯	F12100 散腫堅滻湯	F23010 獄痹湯	
F05070 右歸丸	F09160 胃苓湯	F12020 蒼朮濟毒飲		
F05090 四君子湯	F09170 胃舒寧	F12050 脣著湯		
F05100 四味香薷飲	F09180 茵甘薑味辛夏仁湯	F12060 華蓋散		



勝昌製藥廠

Sheng Chang Pharmaceutical Co., Ltd.

勝昌健胃散

- 降胃酸逆流
- 緩解腹脹悶痛
- 健胃理氣助消化

現代人居家生活常備藥品

有效改善各種胃部不適



勝昌便利藥



勝昌製藥廠

Sheng Chang Pharmaceutical Co., Ltd.

- 維持肌力充沛
- 延緩人體衰老
- 治療腰膝無力
- 治療青壯年白髮

延齡
固本



肝腎系列



精氣神系列



筋骨系列



眼睛系列

勝昌製藥廠股份有限公司

總公司：台北市中正區和平西路二段56號

中壢廠：桃園市中壢區民族路六段436,436-1號

免付費服務專線：**0800-261-099**

(使用前詳閱說明書警語及注意事項) 桃市中藥廣字第1130500008號
 衛署成製字第001499號 衛署成製字第011121號 衛署成製字第001489號
 衛署成製字第010860號 衛署成製字第013688號 衛署成製字第001494號