

簡明中藥鑑別手冊

Concise Identification Manual for Chinese Materia Medica

主編：張永勳、何玉鈴

Chief Editors: Yuan-Shiun Chang, Yu-Ling Ho

衛生福利部 編印

Published by Ministry of Health and Welfare

中華民國一〇六年五月

May, 2017



發行人序



中醫藥歷史悠久為人類重要傳統文化，自遠古時代有神農嘗百草傳說，秦漢時期《神農本草經》問世，惟古代多數中醫藥著作對藥物型態之圖樣、特徵說明及考據缺漏，以致於傳統中醫藥著作多有中藥材名物不符情形出現。至唐朝編修世界上最早的法定藥典《新修本草》，內容增加藥物圖樣之「藥圖」，及藥物特徵說明之「圖經」，自此始建立傳統中藥本草學系統。

中藥材源自動物、植物及礦物等天然物，種類繁多，各地使用中藥之習慣與名稱未盡相同，易造成中藥材品種混淆誤用。為了確保中藥的正確性、療效和使用安全，對中藥材進行系統的品種整理和品質研究，為中醫藥發展的重要課題。

為強化中藥專業人才藥材鑑定能力，並提供中藥材考據便利性，本部委託中國醫藥大學張永勳教授及弘光科技大學何玉鈴副教授執行「中藥販賣業及中藥製造業中藥材辨識人才培訓」計畫，除在全臺北、中、南、東等區域辦理七場「中藥製造廠人員易混淆藥材辨識研習會」及「中藥販賣業人員中藥材辨識研習會」以外，並針對臺灣常見易混淆中藥材，利用簡易清晰之圖說方式呈現藥材外觀性狀，建立快速正確且簡單的鑑別方法，期將辨識易混淆中藥材的知識予以普及。

本書付梓之際，對於承辦計畫之團隊、各界專家學者及本部中醫藥司同仁之協助，特致謝忱，殷切期盼本書為中醫藥及各界廣泛使用及參考，奠定國人中藥用藥安全基礎，進而提升中醫藥品質。

衛生福利部
部長 **陳時中** 謹識
中華民國一〇六年五月



李校長序

中國醫藥大學自創校以來，即以中、西醫學結合及發展傳統中醫研究為特色，推動中醫藥科學化與現代化，弘揚拓展中華民族的重要瑰寶。中藥種類繁多，基原複雜，藥材名因各傳統典籍記載略有差異，或是依地區習慣而有許多別名，易造成混淆及錯用，若此情形於臨床用藥上，不僅會影響療效，嚴重甚至引起中毒。

為致力推動台灣中藥的研究發展，本校張永勳教授歷年來多次接受行政院衛生署中醫藥委員會及衛生福利部中醫藥司委託執行中藥研究相關計畫，期間也曾擔任本校附設醫院中藥局主任及中國藥學研究所所長，並於 2011 年起應香港衛生署邀請參與香港中藥材標準計畫，透過多年持續走訪台灣、大陸及世界各大中藥栽培基地及藥園，累積豐富之實務經驗；另積極參與衛生福利部中醫藥司多項中藥相關政策性研究計畫之執行，協助編修臺灣中藥典、臺灣中藥典圖鑑及英文版臺灣中藥典，為中醫藥界努力。

張永勳教授過去長期協助行政院衛生署及衛生福利部辦理中藥從業人員易誤用混用藥材之教育訓練，以此基礎下，此次與弘光科技大學何玉鈴副教授協助衛生福利部編撰「簡明中藥鑑別手冊」，共收載 91 組易混淆藥材，每組皆提供藥材飲片比對。

張永勳教授在用心投入教學、行政及研究之餘，撰寫完成「簡明中藥鑑別手冊」，本人感佩其治學之勤，成書即將問世，樂為題序。

中國醫藥大學

校長 李文華 謹致

中華民國一〇六年五月

總編輯序



中藥品種繁多，產地廣闊，地區用藥名稱和使用習慣的不同，類似品、代用品和民間用藥的不斷出現，中藥同物異名、同名異物及品種混亂現象甚為普遍，直接影響到藥材品質與療效。五官鑑別法為一般中藥從業人員主要及常用之基礎功夫，能由藥材外觀性狀初步鑑定其品項之真偽優劣，但過去國內誤用、混用藥材鑑別相關書籍多以顯微鑑別與化學鑑別為主，需要相關實驗儀器輔助，判斷耗時且不便利，因此強化中藥材之外觀形態鑑別方法為增進中醫藥發展之重要一環。

本書藉由分析衛生福利部近 3 年查驗登記申請案誤用、混用中藥材品項及台灣市售常見之中藥品項，針對誤混用類型分成三大組，並依《臺灣中藥典》所記載之法定品種為正品藥材，提供藥材品項之基原與飲片或原藥材圖片，全書收載有外部型態相仿易混淆藥材 54 組、文字讀音易混淆藥材 30 組及非藥用部位過多藥材 7 組，共 91 組。

承蒙衛生福利部中醫藥司之支持，透過計畫得以出版此書。為提高使用此書之便利性，與中醫藥司及專家學者多次開會討論，規劃以「口袋書」方式呈現，藉此方便中醫師、藥師、中藥從業人員及衛生局稽查人員攜帶參考，或是提供中藥從業人員及民眾也有更多學習的機會，達到廣泛宣導及教育之效果。

希冀本書能成為中醫藥相關從業人員之工具書，其方便性能落實推廣民眾中藥正確品種觀念之普及化，藉此提升國人用藥安全。惟編寫時間倉促，書中錯漏之處在所難免，祈請先進學者不吝指正。

張永勳 何玉鈴 謹致

中華民國一〇六年五月

作者簡介

張永勳 博士

現職：

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系 教授

中國醫藥大學附設醫院中藥局 顧問

香港中藥標準化科學委員會 委員

學歷：

美國伊利諾大學 藥化生藥學系 博士

中國醫藥學院 中國藥學研究所 藥學碩士

中國醫藥學院 藥學系 藥學學士

經歷：

中國醫藥大學 公共事務處 處長

中國醫藥大學 中國藥學研究所 所長

中國醫藥學院 主任秘書

中國醫藥學院 推廣教育中心 主任

中國醫藥學院 附設醫院中藥局 主任



何玉鈴 博士

現職：

弘光科技大學護理系 副教授

學歷：

中國醫藥學院 中國藥學研究所 藥學博士

中國醫藥學院 中國藥學研究所 藥學碩士

中國醫藥學院 藥學系 藥學學士

經歷：

弘光科技大學護理系 助理教授

弘光科技大學護理系 兼任講師



About the Author



Yuan-Shiun CHANG, Ph. D.

Present Position:

Professor, Department of Chinese Pharmaceutical Sciences and Chinese Medicine Resources, College of Chinese Medicine, China Medical University

Consultant, Chinese Crude Drug Pharmacy, University Hospital, China Medical University

Member, Scientific Committee, Hong Kong Chinese Materia Medica Standards

Education:

Ph.D. in Pharmacognosy, University of Illinois at Chicago, Illinois, U.S.A.

M.S., Graduate Institute of Chinese Pharmaceutical Sciences, China Medical College

B.S., School of Pharmacy, China Medical College

Experiences:

Dean, Office of International and Public Affairs, China Medical University

Director, Graduate Institute of Chinese Pharmaceutical Sciences, China Medical University

Chief Secretary, China Medical College

Director, Extension Program Center, China Medical College

Director, Chinese Crude Drug Pharmacy, China Medical College Hospital

Yu-Ling HO, Ph. D.

Present Position:

Associate Professor, Department of Nursing, Hungkuang University

Education:

Ph.D. & M.S., Graduate Institute of Chinese Pharmaceutical Sciences, China Medical College

B.S., School of Pharmacy, China Medical College

Experiences:

Assistant Professor, Department of Nursing, Hungkuang University

Instructor, Department of Nursing, Hungkuang University



目錄

發行人序.....	I
李校長序.....	II
總編輯序.....	III
作者簡介.....	IV

一、外部型態相仿

山藥.....	1
川貝母.....	2
五味子.....	5
天南星.....	6
木瓜.....	7
冬葵子.....	8
冬蟲夏草.....	9
白花蛇舌草.....	11
白前.....	12
白茅根.....	13
白頭翁.....	14
白薤.....	15
石韋.....	16
石蓮子.....	17
地膚子.....	18
肉蓯蓉.....	19
何首烏.....	21
決明子.....	22
沙苑蒺藜.....	24
皂莢.....	27

芒硝.....	28
豆蔻.....	29
赤小豆.....	30
防己（粉防己）.....	32
玫瑰花.....	34
金線連.....	35
青箱子.....	36
青蒿.....	37
胡黃連.....	38
枳實.....	39
枸骨葉.....	40
韭菜子.....	42
凌霄花.....	43
桑寄生.....	45
海桐皮.....	47
骨碎補.....	48
密蒙花.....	50
梔子（山梔子）.....	51
鹿茸.....	52
麥芽.....	53
琥珀.....	54
絡石藤.....	55
菟絲子.....	56
黃耆.....	57
篇蓄.....	58
槐枝.....	59
蒲公英.....	60
豨薟草.....	61
酸棗仁.....	63
澤漆.....	64
雞冠花.....	65

藕節.....	66
藿香.....	67
鶴虱.....	68

二、文字讀音混淆

八角茴香（大茴香）.....	71
丁香.....	72
大青葉.....	73
山慈菇.....	74
五加皮.....	76
木通.....	77
牛膝（懷牛膝）.....	79
王不留行.....	81
北板藍根.....	82
半夏.....	83
白附子（禹白附）.....	84
白英.....	85
石斛.....	86
石菖蒲.....	87
艾葉.....	89
刺五加.....	90
金錢草.....	91
金櫻子.....	92
胡麻仁.....	93
重樓.....	94
茵陳（綿茵陳）.....	95
馬錢子（番木鱉）.....	96
敗醬草.....	97
番紅花.....	98
漏蘆（祁州漏蘆）.....	99

貫眾（綿馬貫眾）.....	100
劉寄奴（南劉寄奴）.....	102
墨旱蓮.....	103
橘紅.....	104
澤蘭.....	106

三、非藥用部位過多

山茱萸.....	107
花椒.....	108
枳椇子.....	110
夏枯草.....	111
柴胡.....	112
桂心.....	113
蒲黃.....	115

附錄

多藥用部位植物一覽表.....	117
處方中應使用之藥材名稱.....	122
參考文獻.....	125
藥材中文索引.....	127
基原拉丁學名索引.....	135



- 簡明中藥鑑別手冊 -

一、外部型態相仿

◎山藥

正品：山藥

【基原】薯蓣科 *Dioscoreaceae* 植物薯蓣 *Dioscorea opposita* Thunb.、恆春薯蓣 *Dioscorea doryphora* Hance 或基隆山藥 *Dioscorea japonica* Thunb. var. *pseudojaponica* (Hayata) Yamam. 之乾燥根莖。

■ 富粉性



山藥（平滑）

1 cm

混淆品：木薯

【基原】大戟科 *Euphorbiaceae* 植物木薯 *Manihot esculenta* Crantz 之乾燥塊根。



■ 具木心

木薯（斜切）

1 cm

◎川貝母

正品：川貝母

【基原】百合科 Liliaceae 植物川貝母 *Fritillaria cirrhosa* D. Don、暗紫貝母 *Fritillaria unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia、甘肅貝母 *Fritillaria przewalskii* Maxim.、梭砂貝母 *Fritillaria delavayi* Franch.、太白貝母 *Fritillaria taipaiensis* P. Y. Li 或瓦布貝母 *Fritillaria unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia var. *wabuensis* (S. Y. Tang et S. C. Yue) Z. D. Liu, S. Wang et S. C. Chen 之乾燥鱗莖。按性狀不同分為「松貝」、「青貝」、「爐貝」和「栽培品」。「松貝」和「青貝」主要來源於川貝母、暗紫貝母和甘肅貝母；「爐貝」主要來源於梭砂貝母；「栽培品」主要來源於瓦布貝母和太白貝母。



(松貝 - 暗紫貝母)

1 cm

■ 外層鱗葉2瓣，大小懸殊，大瓣緊抱小瓣，習稱「懷中抱月」



(爐貝 - 梭砂貝母)

1 cm

■ 外層鱗葉2瓣，大小相近，頂部開裂而略尖，基部平

◎川貝母

混淆品：浙貝母

【基原】百合科 Liliaceae 植物浙貝母 *Fritillaria thunbergii* Miq. 之乾燥鱗莖。採挖洗淨，大小分開，小者不去芯芽，習稱「珠貝」，大者除去芯芽，習稱「大貝」。

■ 外層鱗莖葉2瓣，肥厚，略似腎形



(浙貝母 - 珠貝)

1 cm

■ 鱗莖外層的單瓣鱗葉，略呈新月形



(浙貝母 - 大貝)

1 cm

◎川貝母

混淆品：平貝母

【基原】百合科 Liliaceae 植物平貝母 *Fritillaria ussuriensis* Maxim. 之乾燥鱗莖。

- 扁球形，外層鱗葉2瓣，大小相近，頂端略平或微凹入



1 cm

混淆品：土貝母

【基原】葫蘆科 Cucurbitaceae 植物土貝母 *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet 之乾燥塊莖。

- 不規則的塊，表面淡紅棕色或暗棕色，凹凸不平



1 cm

◎五味子

正品：北五味子

【基原】木蘭科 Magnoliaceae 植物五味子 *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. 之乾燥成熟果實。


■ 果肉柔軟



1 cm



■ 被白霜北五味子



■ 北五味子種子
(呈腎形，表面較光滑)

正品：南五味子

【基原】木蘭科 Magnoliaceae 植物華中五味子 *Schisandra sphenanthera* Rehd. et Wils. 之乾燥成熟果實。

■ 果肉乾癢，皺縮



1 cm



■ 南五味子種子
(表面較粗糙)

◎天南星

正品：天南星

【基原】天南星科 *Araceae* 植物異葉天南星 *Arisaema heterophyllum* Blume、天南星 *Arisaema erubescens* (Wall.) Schott 或東北天南星 *Arisaema amurense* Maxim. 之乾燥塊莖。

■ 具凹陷莖痕



■ 天南星原藥材

混淆品：虎掌天南星

【基原】天南星科 *Araceae* 植物虎掌 *Pinellia pedatisecta* Schott 之乾燥塊莖。

■ 具側生塊莖



■ 虎掌天南星原藥材

◎木瓜

正品：木瓜

【基原】薔薇科 Rosaceae 植物貼梗海棠 *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai 之乾燥近成熟果實，習稱「皺皮木瓜」。

■ 外皮皺縮橢圓形



1 cm

混淆品：光皮木瓜

【基原】薔薇科 Rosaceae 植物光皮木瓜 *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne 之乾燥近成熟果實。

■ 外表面光滑無皺或稍粗糙



1 cm

◎冬葵子

正品：冬葵子

【基原】錦葵科 *Malvaceae* 植物冬葵 *Malva verticillata* L. 之乾燥成熟種子。



1 cm



■ 呈腎形，種皮棕褐色或黑褐色

混淆品：苘麻子

【基原】錦葵科 *Malvaceae* 植物苘麻 *Abutilon theophrasti* Medic. 之乾燥成熟種子。



1 cm



■ 呈三角狀扁腎形，種皮灰黑色或暗褐色

◎冬蟲夏草

正品：冬蟲夏草

【基原】麥角菌科 Clavicipitaceae 真菌冬蟲夏草菌 *Cordyceps sinensis* (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座及蟲體屍體之乾燥複合體。



■ 子座單生，細長圓柱形，表面深棕色至棕褐色

■ 蟲體足明顯，氣門不明顯，質脆易斷



■ 蟲體似蠶，表面深棕黃色至黃棕色，有20~30個環紋，中部4對足較明顯

混淆品：草石蠶

【基原】唇形科 Labiatae 植物草石蠶 *Stachys sieboldii* Miq. 之乾燥塊莖。



■ 無子座

■ 節間可見點狀芽痕及根痕



■ 多呈紡錘形，頂端有的呈螺旋狀，兩端略尖，表面棕黃色，有5~15個環節

◎冬蟲夏草

混淆品：北蟲草

【基原】麥角菌科 Clavicipitaceae 真菌蛹蟲草菌
Cordyceps militaris (Fr.) Link 之人工栽培子實體。



◎白花蛇舌草

正品：白花蛇舌草

【基原】茜草科 Rubiaceae 植物白花蛇舌草 *Hedyotis diffusa* Willd. 之乾燥全草。



■ 花多單一，
蒴果扁球形

混淆品：水線草

【基原】茜草科 Rubiaceae 植物水線草 *Hedyotis corymbosa* (L.) Lam. 之乾燥全草。



■ 花 2 ~ 5 朵呈繖房
狀排列，蒴果球形

◎白前


正品：白前

【基原】蘿藦科 Asclepiadaceae 植物柳葉白前 *Cynanchum stauntonii* (Decne.) Schltr. ex Levl. 或 芫花葉白前 *Cynanchum glaucescens* (Decne.) Hand.-Mazz. 之乾燥根莖及根。



混淆品：白薇

【基原】蘿藦科 Asclepiadaceae 植物白薇 *Cynanchum atratum* Bunge 或 蔓生白薇 *Cynanchum versicolor* Bunge 之乾燥根及根莖。



◎白茅根

正品：白茅根

【基原】禾本科 Gramineae 植物白茅 *Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) C. E. Hubb. 之乾燥根莖。



1 cm



■ 根莖橫切面可見氣孔呈環狀排列，髓部呈中空狀

混淆品：白草

【基原】禾本科 Gramineae 植物白草 *Pennisetum flaccidum* Griseb. 之乾燥根莖。



1 cm



■ 根莖橫切面氣孔多不明顯，髓部亦多非中空

◎白頭翁

正品：白頭翁

【基原】毛茛科 Ranunculaceae 植物白頭翁 *Pulsatilla chinensis* (Bunge) Regel 之乾燥根。

■ 根頭部稍膨大，稍具白色絨毛



混淆品：委陵菜

【基原】薔薇科 Rosaceae 植物委陵菜 *Potentilla chinensis* Ser. 之乾燥全草。

■ 葉下表面和葉柄均密被灰白色柔毛



◎白蘞

正品：白蘞

【基原】葡萄科 *Vitaceae* 植物白蘞 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino 之乾燥塊根。

■ 切面淺紅棕色，具放射狀紋理，粉性



混淆品：木鱉根

【基原】葫蘆科 *Cucurbitaceae* 植物木鱉 *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng. 之乾燥塊根。

■ 表面纖維性強，粉性差



◎石韋

正品：石韋

【基原】水龍骨科 Polypodiaceae 植物廬山石韋 *Pyrrosia sheareri* (Bak.) Ching、石韋 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell 或有柄石韋 *Pyrrosia petiolosa* (Christ) Ching 之乾燥葉。



混淆品：青石韋

【基原】蹄蓋蕨科 Athyriaceae 植物單葉雙蓋蕨 *Diplazium subinuatum* (Wall. ex Hook. & Grev.) Tagawa 之乾燥葉。

■ 完整葉片展平後，呈條狀披針形



◎石蓮子

正品：石蓮子

【基原】睡蓮科 *Nymphaeaceae* 植物蓮 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 之乾燥成熟果實。

■ 卵圓形或橢圓形，兩端微尖



混淆品：苦石蓮

【基原】豆科 *Leguminosae* 植物喙莢雲實 *Caesalpinia minax* Hance 之乾燥成熟種子。

■ 橢圓形，兩端鈍圓



◎地膚子

正品：地膚子

【基原】藜科 *Chenopodiaceae* 植物地膚 *Kochia scoparia* (L.) Schrad. 之乾燥成熟果實。



1 cm



■ 扁球狀五角星形，表面淺棕色，背面中心有突起點狀果梗痕及放射狀脈紋

混淆品：藜實

【基原】藜科 *Chenopodiaceae* 植物藜 *Chenopodium album* L. 之乾燥成熟果實。



1 cm



■ 胞果五角狀扁球形，表面黃綠色，頂端5裂，背面具5稜線，呈放射狀

◎肉蓯蓉

正品：肉蓯蓉

【基原】列當科 Orobanchaceae 植物肉蓯蓉 *Cistanche deserticola* Y. C. Ma 之帶鱗葉的乾燥肉質莖。

- 斷面暗棕色，有淡褐色點狀維管束，維管束呈波浪狀排列，中心具髓或有時中空



1 cm



- 肉蓯蓉原藥材
(質地鬆軟)

正品：管花肉蓯蓉

【基原】列當科 Orobanchaceae 植物管花肉蓯蓉 *Cistanche tubulosa* (Schrenk) Wight 之帶鱗葉的乾燥肉質莖。

- 斷面顆粒性，灰棕色，散生褐色維管束小點



1 cm



- 管花肉蓯蓉原藥材
(質地堅硬)

◎肉蓯蓉

混淆品：草蓯蓉

【基原】列當科 Orobanchaceae 植物草蓯蓉 *Boschniakia rossia* (Cham. et Schitdl) Fedtsch. et Flerov 之帶鱗葉的乾燥肉質莖及花序。

■ 莖單一，表面褐紫色，質脆，易折斷



混淆品：鹽生肉蓯蓉

【基原】列當科 Orobanchaceae 植物鹽生肉蓯蓉 *Cistanche salsa* (C. A. Mey) Benth. et Hook. f. 之帶鱗葉的乾燥肉質莖。

■ 圓柱形，密被覆瓦狀排列之肉質鱗葉，鱗葉較薄



◎何首烏

正品：何首烏

【基原】蓼科 Polygonaceae 植物何首烏 *Polygonum multiflorum* Thunb. 之乾燥塊根。

■ 切面淺黃棕色至淡紅棕色，粉性，有異形維管束形成之「雲紋」

■ 棕黑色，維管束隱約可見



生何首烏

1 cm



製何首烏

1 cm

混淆品：黃藥子

【基原】薯蕷科 Dioscoreaceae 植物黃獨 *Dioscorea bulbifera* L. 之乾燥塊莖。

■ 切面黃棕色，凹凸不平，顆粒狀，散佈橙黃色麻點



1 cm

◎決明子

正品：決明子（決明）

【基原】豆科 Leguminosae 植物決明 *Cassia obtusifolia* L. 之乾燥成熟種子。



1 cm



■ 具淺黃色線狀凹紋

正品：決明子（小決明）

【基原】豆科 Leguminosae 植物小決明 *Cassia tora* L. 之乾燥成熟種子。



1 cm




■ 具淺黃色帶狀

◎決明子

混淆品：茈芒決明

【基原】豆科 Leguminosae 植物槐葉決明 *Cassia sophora*
L. 之乾燥成熟種子。




1 cm



■ 中央有橢圓形凹斑，種
臍明顯歪斜

混淆品：望江南

【基原】豆科 Leguminosae 植物望江南 *Cassia occidentalis*
L. 之乾燥成熟種子。



1 cm




■ 中央有淡褐色橢圓形斑
點，微凹，種臍略歪斜

◎沙苑蒺藜

正品：沙苑蒺藜

【基原】豆科 Leguminosae 植物扁莖黃耆 *Astragalus complanatus* R. Br. 之乾燥成熟種子。



■ 腎形而稍扁，邊緣一側微凹處具淡色種臍

1 cm

混淆品：南美豬屎豆

【基原】豆科 Leguminosae 植物光萼豬屎豆（南美豬屎豆）*Crotalaria zanzibarica* Benth. 之乾燥成熟種子。



■ 三角狀腎形，表面橙紅色或棕紅色，光滑，一側中央凹陷呈鉤狀

1 cm

◎沙苑蒺藜

混淆品：黃野百合

【基原】豆科 Leguminosae 植物黃野百合（豬屎豆）*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill 之乾燥成熟種子。



1 cm



■ 長腎形，表面具油亮光澤感，凹陷明顯，整體近「C」字形

混淆品：紫雲英

【基原】豆科 Leguminosae 植物紫雲英 *Astragalus sinicus* L. 之乾燥成熟種子。



1 cm



■ 斜長方形，開口處有小勾

◎沙苑蒺藜

混淆品：直立黃耆

【基原】豆科 Leguminosae 植物直立黃耆 *Astragalus adsurgens* Pall. 之乾燥成熟種子。



■ 類長橢圓形，腹側
凹陷處較深

1 cm

混淆品：蒺藜

【基原】蒺藜科 Zygophyllaceae 植物蒺藜 *Tribulus terrestris* L. 之乾燥成熟果實。



■ 果實由5個分果瓣組成，
呈放射五棱狀球形

1 cm

◎ 皂莢

正品：皂莢

【基原】豆科 Leguminosae 植物皂莢 *Gleditsia sinensis* Lam.
之乾燥成熟果實。

■ 扁長條狀或劍鞘狀



混淆品：豬牙皂

【基原】豆科 Leguminosae 植物皂莢 *Gleditsia sinensis* Lam.
之乾燥不育果實。

■ 鐮刀狀



◎ 芒硝

正品：芒硝

【基原】硫酸鹽類礦物芒硝族芒硝，經加工精製而成的結晶體。主要成分為含水硫酸鈉 ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)。

■ 含水硫酸鈉呈透明結晶

■ 風化後，呈白色粉末狀



芒硝 (左) 及風化後芒硝 (右)

1 cm

混淆品：明礬

【基原】礦物明礬石，經加工提煉而成的結晶。主要成分為含水硫酸鋁鉀 ($\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)。

■ 明礬呈略透明結晶



1 cm

◎豆蔻

正品：豆蔻

【基原】薑科 Zingiberaceae 植物白豆蔻 *Amomum cardamomum* L. 之乾燥成熟果實。

- 表面黃白色至淡黃棕色，有3條縱向槽紋



- 果實內分3室，每室約有種子10粒

1 cm

混淆品：草豆蔻

【基原】薑科 Zingiberaceae 植物草豆蔻 *Alpinia katsumadai* Hayata 之乾燥近成熟種子。

- 類球形的種子團，表面灰褐色



1 cm

◎赤小豆

正品：赤小豆

【基原】豆科 Leguminosae 植物赤小豆 *Vigna calcaratus* Roxb. 之乾燥成熟種子。



1 cm

■ 種臍凸起



■ 圓柱形而稍扁，較細長

正品：赤豆

【基原】豆科 Leguminosae 植物赤豆 *Vigna angularis* Ohwi et Ohashi 之乾燥成熟種子。



1 cm

■ 種臍無凸起



■ 近矩圓形而稍扁，較粗短

◎赤小豆

混淆品：木豆

【基原】豆科 Leguminosae 植物木豆 *Cajanus cajan* (L.) Millsp. 之乾燥成熟種子。



■ 種臍長圓形



■ 圓形

◎防己（粉防己）

正品：防己（粉防己）

【基原】防己科 Menispermaceae 植物粉防己 *Stephania tetrandra* S. Moore 之乾燥根。

- 有稀疏的放射狀紋理，富粉性



1 cm

混淆品：廣防己

【基原】馬兜鈴科 Aristolochiaceae 植物廣防己 *Aristolochia fangchi* Y. C. Wu ex L. D. Chow & S. M. Hwang 之乾燥根。

- 有V型稠密放射狀紋理，粉性較弱



1 cm

◎防己（粉防己）

混淆品：青風藤

【基原】防己科 Menispermaceae 植物青藤 *Sinomenium acutum* (Thunb.) Rehd. et Wils. 和毛青藤 *Sinomenium acutum* (Thunb.) Rehd. et Wils. var. *cinereum* Rehd. et Wils. 之乾燥藤莖。

■ 木部具放射狀紋理，其間具小孔



1 cm

混淆品：小果微花藤

【基原】茶茱萸科 Icacinaceae 植物小果微花藤 *Iodes vitiginea* (Hance) Hemsl. 之乾燥根及根莖。

■ 有疏放射狀紋理，質堅硬，具粉性



1 cm

◎玫瑰花

正品：玫瑰花

【基原】薔薇科 Rosaceae 植物玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb. 之乾燥花蕾。

- 半球形或不規則團狀，花托半球形，花瓣覆瓦狀排列，寬卵形



混淆品：月季花

【基原】薔薇科 Rosaceae 植物月季 *Rosa chinensis* Jacq. 之乾燥花蕾。


- 類球形，花托長圓形，花瓣覆瓦狀排列或散落，長圓形



◎金線連

正品：金線連

【基原】蘭科 Orchidaceae 植物臺灣金線連 *Anoectochilus formosanus* Hayata 之乾燥全草。



混淆品：銀線連

【基原】蘭科 Orchidaceae 植物銀線連 *Goodyera matsumurana* Schltr. 之乾燥全草。




◎青葙子

正品：青葙子

【基原】莧科 *Amaranthaceae* 植物青葙 *Celosia argentea* L. 之乾燥成熟種子。



1 cm



■ 扁圓形，中央微隆起，表面黑色或紅黑色，有光澤，具微凹種臍

混淆品：雞冠子

【基原】莧科 *Amaranthaceae* 植物雞冠花 *Celosia cristata* L. 之乾燥成熟種子。



1 cm




■ 扁圓形，表面棕紅色至黑色，光澤較差

◎青蒿

正品：青蒿

【基原】菊科 Compositae 植物黃花蒿 *Artemisia annua* L. 之乾燥地上部分。



■ 莖圓柱形



■ 羽狀複葉



■ 頭狀花序·球形，多數組成圓錐狀

混淆品：茵陳蒿

【基原】菊科 Compositae 植物濱蒿 *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. 或茵陳蒿 *Artemisia capillaris* Thunb. 之乾燥地上部分，秋季採割帶花蕾。



茵陳 - 茵陳蒿 (濱蒿)



■ 頭狀花序卵形

◎胡黃連

正品：胡黃連

【基原】玄參科 Scrophulariaceae 植物胡黃連 *Picrorhiza scrophulariiflora* pennell 之乾燥根莖。



1 cm



■ 胡黃連切面

混淆品：鐵破鑼

【基原】毛茛科 Ranunculaceae 植物鐵破鑼 *Beesia calthaefolia* (Maxim.) Ulbr. 之乾燥根莖。



1 cm




■ 鐵破鑼切面

◎枳實

正品：枳實

【基原】芸香科 *Rutaceae* 植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 及其栽培變種或甜橙 *Citrus sinensis* Osbeck 之乾燥幼果。



混淆品：綠衣枳實

【基原】芸香科 *Rutaceae* 植物枸橘 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. 之乾燥幼果。



◎ 枸骨葉

正品：枸骨葉

【基原】冬青科 Aquifoliaceae 植物枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. ex Paxt. 之乾燥葉。



- 類長方形
- 葉基平截或寬楔形
- 邊緣略反捲，兩側有時各具刺齒1-3枚，先端具3枚較大的硬刺齒，頂端1枚常反曲

1 cm

混淆品：十大功勞葉

【基原】小檗科 Berberidaceae 植物闊葉十大功勞葉 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr. 或細葉十大功勞 *Mahonia fortunei* (Lindl.) Fedde 之乾燥葉。



- 長橢圓狀直方形
- 葉基楔形，常歪斜
- 邊緣略反捲，兩側各有2~8枚刺狀鋸齒

(十大功勞葉 - 細葉十大功勞)

1 cm

◎ 枸骨葉

混淆品：貓兒刺

【基原】冬青科 Aquifoliaceae 植物貓兒刺 *Ilex pernyi* Franch. 之乾燥葉。



- 卵狀長橢圓形
- 葉基近圓形
- 先端具3個硬刺，基部有2個硬刺

1 cm

◎韭菜子

正品：韭菜子

【基原】百合科 Liliaceae 植物韭菜 *Allium tuberosum* Rottl. ex Spreng. 之乾燥成熟種子。



1 cm



■ 表面具細密的網狀皺紋

混淆品：蔥子（蔥實）

【基原】百合科 Liliaceae 植物蔥 *Allium fistulosum* L. 之乾燥成熟種子。



1 cm



■ 表面多光滑或偶有疏皺紋

◎凌霄花

正品：凌霄花

【基原】紫葳科 Bignoniaceae 植物凌霄 *Campsis grandiflora* (Thunb.) K. Schum. 或美洲凌霄 *Campsis radicans* (L.) Seem. 之乾燥花。

■ 花冠先端5裂，裂片半圓形，下部聯合呈漏斗狀



■ 花萼鐘狀



■ 凌霄花內表面
(具條狀紋路)

1 cm

混淆品：泡桐花

【基原】玄參科 Scrophulariaceae 植物泡桐 *Paulownia fortunei* (Seem.) Hemsl. 或毛泡桐 *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. 之乾燥花。

■ 花萼少見，花冠倒圓錐形



■ 泡桐花內表面
(紫色斑點密佈)

1 cm

◎凌霄花

混淆品：洋金花

【基原】茄科 Solanaceae 植物白花曼陀羅 *Datura metel* L. 之乾燥花。



◎桑寄生

正品：桑寄生

【基原】桑寄生科 Loranthaceae 植物桑寄生 *Taxillus chinensis* (DC.) Danser 之乾燥帶葉莖枝。

■ 枝條多對生，圓柱狀



■ 枝條表面縱向細皺紋，有多數細小皮孔

1 cm

混淆品：桑樹粗枝

【基原】桑科 Moraceae 植物桑 *Morus alba* L. 之乾燥粗枝。

■ 木部黃白色，年輪明顯，質地較為鬆散



1 cm

◎桑寄生

混淆品：槲寄生

【基原】桑寄生科 Loranthaceae 植物槲寄生 *Viscum coloratum* (Komar.) Nakai 之乾燥帶葉莖枝。

■ 形成層環明顯·射線類白色



混淆品：紅花桑寄生

【基原】桑寄生科 Loranthaceae 植物紅花桑寄生 *Taxillus parasiticus* L. 之乾燥帶葉莖枝。



◎海桐皮

正品：海桐皮

【基原】豆科 Leguminosae 植物刺桐 *Erythrina variegata* L. var. *orientalis* (L.) Merr. 或喬木刺桐 *Erythrina arborescens* Roxb. 之乾燥樹皮。

■ 外表皮常有縱溝紋，散佈圓錐形釘刺



(海桐皮 - 刺桐)

1 cm

混淆品：木棉皮

【基原】木棉科 Bombacaceae 植物木棉 *Gossampinus malabarica* (DC.) Merr. 之乾燥樹皮。



■ 內表面紅棕色，
有細縱紋


1 cm

◎骨碎補

正品：骨碎補

【基原】水龍骨科 Polypodiaceae 植物槲蕨 *Drynaria fortunei* (Kunze) J. Sm. 之乾燥根莖。

- 具縱溝紋和葉基痕，並有殘留的黃棕色鱗片



混淆品：大葉骨碎補

【基原】骨碎補科 Davalliaceae 植物大葉骨碎補 *Davallia formosana* Hayata 之乾燥根莖。

- 縱切面中間兩半月形維管束呈線形



◎骨碎補

混淆品：光葉槲蕨

【基原】水龍骨科 Polypodiaceae 植物光葉槲蕨 *Drynaria propinqua* (Wall. ex. Mett.) Bedd. 之乾燥根莖。

- 除去鱗片之表面黃棕色，
可見細小縱紋



混淆品：崖薑蕨

【基原】水龍骨科 Polypodiaceae 植物崖薑蕨 *Pseudodrynaria coronans* (Wall.) Ching 之乾燥根莖。


- 呈紅棕色，具黃色小點。橫切面有
黃白色之維管束排列成不規則多環，
中間有兩小圈維管束



◎密蒙花


正品：密蒙花

【基原】馬錢科 Loganiaceae 植物密蒙花 *Buddleja officinalis* Maxim. 之乾燥花蕾及其花序。



混淆品：結香花

【基原】瑞香科 Thymelaeaceae 植物結香 *Edgeworthia chrysantha* Lindl. 之乾燥花蕾及其花序。



◎梔子（山梔子）

正品：梔子（山梔子）

【基原】茜草科 Rubiaceae 植物梔子 *Gardenia jasminoides* Ellis 之乾燥成熟果實。

■ 長橢圓形



梔子（山梔子）

1 cm

■ 種子團扁卵圓形，深紅或紅黃色



去果殼梔子（山梔子）

1 cm

混淆品：水梔子

【基原】茜草科 Rubiaceae 植物水梔子 *Gardenia jasminoides* Ellis var. *grandiflora* Nakai 之乾燥成熟果實。

■ 長圓形



（水梔子）

1 cm

■ 種子團扁長圓形，黃棕或紅棕色



（去果殼水梔子）

1 cm

◎鹿茸

正品：鹿茸

【基原】鹿科 Cervidae 動物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或馬鹿 *Cervus elaphus* L. 之雄鹿未骨化密生茸毛的幼角，分別習稱「花鹿茸」及「馬鹿茸」。

■ 外皮紅棕色，中部密佈細孔



混淆品：鹿角

【基原】鹿科 Cervidae 動物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或馬鹿 *Cervus elaphus* L. 已骨化之角或鋸茸後翌年春天脫落的角基，分別習稱「花鹿角」、「馬鹿角」、「鹿角脫盤」。

■ 外圍已鈣化呈類白色之鹿角
· 質硬不透光



◎麥芽

正品：麥芽

【基原】禾本科 Gramineae 植物大麥 *Hordeum vulgare* L. 之成熟穎果，經發芽乾燥而成。



1 cm



■ 梭狀，淡黃色，基部
胚根處長出幼芽或鬚根

混淆品：穀芽

【基原】禾本科 Gramineae 植物稻 *Oryza sativa* L. 之成熟穎果，經發芽乾燥而成。



1 cm



■ 長橢圓形，兩端略
尖，稃片下端有初生
的細鬚根或幼芽

◎琥珀

正品：琥珀

【基原】松科 *Pinaceae* 松屬 *Pinus* spp. 植物之樹脂，埋藏地下經年久轉化而成的化石樣物質。



■ 表面血紅色、淡黃色、淡棕色或深棕色，常相間排列

1 cm

混淆品：松香

【基原】松科 *Pinaceae* 植物馬尾松 *Pinus massoniana* Lamb.、油松 *Pinus tabulaeformis* Carr. 或其同屬植物樹幹中取得之油樹脂，經蒸餾或抽取除去揮發油後的殘留物。



■ 表面淡黃色或棕黃色，常有一層黃白色的粉霜

1 cm

◎絡石藤

正品：絡石藤

【基原】夾竹桃科 Apocynaceae 植物絡石 *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 之乾燥帶葉藤莖。

- 葉片橢圓形或倒卵形，葉脈不明顯



混淆品：薜荔

【基原】桑科 Moraceae 植物薜荔 *Ficus pumila* L. 之乾燥帶葉藤莖。

- 葉背網狀葉脈明顯，形成許多小凹窩




■ 薜荔完整葉片

◎ 菟絲子


正品：菟絲子

【基原】旋花科 *Convolvulaceae* 植物南方菟絲子 *Cuscuta australis* R. Br. 或菟絲子 *Cuscuta chinensis* Lam. 之乾燥成熟種子。



混淆品：紫蘇子

【基原】唇形科 *Labiatae* 植物紫蘇 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 之乾燥成熟果實。



◎黃耆

正品：黃耆

【基原】豆科 Leguminosae 植物蒙古黃耆 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao 或膜莢黃耆 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 之乾燥根。

■ 表皮淡黃色至棕褐色



混淆品：紅耆

【基原】豆科 Leguminosae 植物多序岩黃耆 *Hedysarum polybotrys* Hand.-Mazz. 之乾燥根。

■ 表皮紅棕色，較粗糙



◎ 萹蓄

正品：萹蓄

【基原】蓼科 Polygonaceae 植物萹蓄 *Polygonum aviculare* L. 之乾燥地上部分。

■ 葉互生，長橢圓形



混淆品：小飛揚

【基原】大戟科 Euphorbiaceae 植物小飛揚草 *Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp. 之乾燥全草。

■ 葉對生，倒卵形



◎ 槐枝

正品：槐枝

【基原】豆科 Leguminosae 植物槐 *Sophora japonica* L. 之乾燥嫩枝。

■ 皮孔眾多



1 cm



■ 槐枝飲片

混淆品：柳枝

【基原】楊柳科 Salicaceae 植物柳 *Salix babylonica* L. 之乾燥嫩枝。

■ 節上有芽痕



1 cm



■ 柳枝飲片

◎ 蒲公英


正品：蒲公英

【基原】菊科 Compositae 植物蒲公英 *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz.、臺灣蒲公英 *Taraxacum formosanum* Kitamura 及同屬植物之乾燥全草。



混淆品：兔兒菜

【基原】菊科 Compositae 植物兔兒菜 *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai 之乾燥全草。



◎ 豨薟草

正品：豨薟草

【基原】菊科 Compositae 植物豨薟 *Siegesbeckia orientalis* L.、腺梗豨薟 *Siegesbeckia pubescens* Makino 或毛梗豨薟 *Siegesbeckia glabrescens* Makino 之乾燥地上部分。

■ 莖下部呈類圓柱形或扁圓柱形



(豨薟草 - 豨薟)

■ 莖上部有較多對生分枝



(豨薟草 - 腺梗豨薟)

■ 莖較細弱



(豨薟草 - 毛梗豨薟)

◎豨薟草

混淆品：魚針草

【基原】唇形科 Labiatae 植物魚針草 *Anisomeles indica* (L.) Kuntze 之乾燥全草。



1 cm



■ 莖四方形・斷面
有白色髓部



■ 葉片展開圖

◎酸棗仁

正品：酸棗仁

【基原】鼠李科 Rhamnaceae 植物酸棗 *Ziziphus jujuba* Mill. var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H. F. Chou 之乾燥成熟種子。

■ 扁橢圓形，表面紫褐色，中間有突起縱線紋



■ 酸棗仁種子側面圖
(種仁與種皮不易分離)

1 cm

混淆品：滇棗仁

【基原】鼠李科 Rhamnaceae 植物滇刺棗 *Ziziphus mauritiana* Lam. 之乾燥成熟種子。

■ 桃形，表面棕黃色，多有紫紅色斑紋，無明顯隆起的縱線紋



■ 滇棗仁種子側面圖
(種仁與種皮易分離)

1 cm

◎澤漆

正品：澤漆

【基原】大戟科 Euphorbiaceae 植物澤漆 *Euphorbia helioscopia* L. 之乾燥全草。

■ 葉暗綠色，常破碎或脫落，具多數灰色蒴果




1 cm

混淆品：開口箭

【基原】百合科 Liliaceae 植物開口箭 *Tupistra chinensis* Bak. 之乾燥根莖。

■ 斷面淡黃白色，細顆粒狀



1 cm

◎雞冠花

正品：雞冠花

【基原】莧科 *Amaranthaceae* 植物雞冠花 *Celosia cristata* L. 之乾燥花序。

■ 穗狀花序多扁平肥厚，似雞冠狀



混淆品：青葙花

【基原】莧科 *Amaranthaceae* 植物青葙 *Celosia argentea* L. 之乾燥花序。

■ 穗狀花序呈圓柱形或圓錐形



◎藕節

正品：藕節

【基原】睡蓮科 *Nymphaeaceae* 植物蓮 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 之乾燥根莖節部。



混淆品：蓮藕

【基原】睡蓮科 *Nymphaeaceae* 植物蓮 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 之乾燥根莖。



◎ 藿香

正品：藿香

【基原】唇形科 Labiatae 植物藿香 *Agastache rugosa* (Fisch. et Mey.) O. Kuntze 之乾燥地上部分。



混淆品：廣藿香

【基原】唇形科 Labiatae 植物廣藿香 *Pogostemon cablin* (Blanco) Benth. 之乾燥地上部分。

■ 莖略呈方柱形，外皮淡棕色，葉棕綠至棕色，兩面均被灰白色絨毛



◎ 鶴虱

正品：鶴虱

【基原】菊科 Compositae 植物天名精 *Carpesium abrotanoides* L. 之乾燥成熟果實。



1 cm

■ 頂端收縮呈喙狀



■ 具多數縱稜

混淆品：南鶴虱

【基原】繖形科 Umbelliferae 植物野胡蘿蔔 *Daucus carota* L. 之乾燥成熟果實。



1 cm




■ 背面隆起，具4條窄翅狀次稜，翅上密生1列黃白色鉤刺

◎ 鶴虱

混淆品：華南鶴虱

【基原】繖形科 Umbelliferae 植物竊衣 *Torilis japonica* (Houtt.) DC. 之乾燥成熟果實。



■ 背面隆起，密生鉤刺，狀似刺蝟

混淆品：蛇床子

【基原】繖形科 Umbelliferae 植物蛇床 *Cnidium monnieri* (L.) Cuss. 之乾燥成熟果實。



■ 分果半圓形，背面有突起的縱稜5條

- 簡明中藥鑑別手冊 -

二、文字讀音混淆

◎八角茴香（大茴香）

正品：八角茴香（大茴香）

【基原】木蘭科 Magnoliaceae 植物八角茴香 *Illicium verum* Hook. f. 之乾燥成熟果實。

■ 聚合果約由8個蓇葖果聚成，
呈放射狀排列於中軸上



混淆品：小茴香

【基原】繖形科 Umbelliferae 植物茴香 *Foeniculum vulgare* Mill. 之乾燥成熟果實。

■ 分果長橢圓形，背面
隆起，有5條果稜



◎丁香

正品：丁香

【基原】桃金娘科 Myrtaceae 植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunberg 之乾燥花蕾。

■ 似釘狀，暗棕色



1 cm



■ 上端花蕾近球形，下端萼筒圓柱狀，萼先端有4枚三角狀萼片，呈十字狀分開

混淆品：母丁香

【基原】桃金娘科 Myrtaceae 植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunberg 之乾燥近成熟果實。

■ 卵圓形或長橢圓形，褐棕色



1 cm



■ 頂端有4枚分裂萼片，向中央彎曲，基部具果柄殘痕

◎大青葉

正品：大青葉

【基原】十字花科 *Cruciferae* 植物菘藍 *Isatis indigotica* Fort. 之乾燥葉。

- 完整者長卵形至長橢圓狀披針形。上下表面均灰綠色或棕綠色



1 cm

混淆品：馬藍葉

【基原】爵床科 *Acanthaceae* 植物馬藍 *Strobilanthes cusia* (Ness) Kuntze 之乾燥葉。

- 完整者長橢圓形或倒卵狀長圓形。黑綠色或灰綠色



1 cm

◎山慈菇

正品：山慈菇（毛慈菇）

【基原】蘭科 Orchidaceae 植物杜鵑蘭 *Cremastra appendiculata* (D. Don) Makino 之乾燥假鱗莖。

■ 不規則扁球形



■ 基部臍狀，有鬚根或鬚根痕



1 cm

正品：山慈菇（冰球子）

【基原】蘭科 Orchidaceae 植物獨蒜蘭 *Pleione bulbocodioides* (Franch.) Rolfe 或雲南獨蒜蘭 *Pleione yunnanensis* Rolfe 之乾燥假鱗莖。

■ 圓錐形、瓶頸狀



■ 尖端斷頭處呈盤狀



1 cm

◎山慈菇

混淆品：光慈菇

【基原】百合科 Liliaceae 植物老鴉瓣 *Tulipa edulis* (Miq.) Baker 之乾燥鱗莖。

■ 卵狀圓錐形



1 cm

◎五加皮

正品：五加皮

【基原】五加科 *Araliaceae* 植物細柱五加 *Acanthopanax gracilistylus* W.W. Smith 之乾燥根皮。

■ 外表灰褐色，有扭曲縱皺紋及橫長皮孔



混淆品：香加皮

【基原】蘿藦科 *Asclepiadaceae* 植物杠柳 *Periploca sepium* Bge. 之乾燥根皮。

■ 橫切面具黃白色的點狀乳管，具濃郁香氣



◎木通

正品：木通

【基原】木通科 Lardizabalaceae 植物五葉木通 *Akebia quinata* (Thunb.) Decne.、三葉木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. 或白木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. var. *australis* (Diels) Rehd. 之乾燥藤莖。

- 表面灰棕色，粗糙，有不規則縱皺紋



- 木通-五葉木通飲片

- 表面灰色、灰棕色，顏色不均勻，極粗糙



- 木通-三葉木通飲片

- 表面棕黃色，有不規則縱皺紋



- 木通-白木通飲片

◎木通

混淆品：川木通

【基原】毛茛科 *Ranunculaceae* 植物繡球藤 *Clematis montana* Buch.-Ham. 或小木通 *Clematis armandii* Franch. 之乾燥藤莖。

■ 表面灰黃色，具縱溝及稜脊，幾無毛



■ 川木通飲片:斷面有明顯車輪紋，淺黃色

1 cm

混淆品：關木通

【基原】馬兜鈴科 *Aristolochiaceae* 植物東北馬兜鈴 *Aristolochia manshuriensis* Kom. 之乾燥藤莖。

■ 表面淺棕黃色，平滑，節部稍膨大，不易折斷



■ 關木通飲片:斷面黃白色，導管呈針孔狀，呈多層同心環狀排列

1 cm

◎牛膝（懷牛膝）

正品：：牛膝（懷牛膝）

【基原】莧科 *Amaranthaceae* 植物牛膝 *Achyranthes bidentata* Blume 之乾燥根。

- 斷面中央有細小黃白色木心
2~4層異型維管束排列



牛膝（懷牛膝）（斜切）

1 cm

- 中間有細小黃白色木心



牛膝（懷牛膝）（橫切）

1 cm

◎牛膝（懷牛膝）

混淆品：川牛膝（臺灣習稱杜牛膝）

【基原】莧科 *Amaranthaceae* 植物川牛膝 *Cyathula officinalis* Kuan 之乾燥根。

- 斷面可見數層同心環7~9層異型維管束排列



1 cm

混淆品：味牛膝（臺灣習稱川牛膝）

【基原】爵床科 *Acanthaceae* 植物腺毛馬藍 *Strobilanthes forrestii* Diels 之乾燥根及根莖。

- 不規則塊狀切片，斷面暗灰色，邊緣呈不規則深裂




1 cm

◎王不留行

正品：王不留行

【基原】石竹科 Caryophyllaceae 植物麥藍菜 *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke 之乾燥成熟種子。



■ 表面黑色，密布細小顆粒狀突起

1 cm

混淆品：野牡丹

【基原】野牡丹科 Melastomaceae 植物野牡丹 *Melastoma candidum* D.Don 之乾燥粗莖及根。

■ 有皮部殘留



■ 可見年輪

1 cm

◎北板藍根

正品：北板藍根

【基原】十字花科 *Cruciferae* 植物菘藍 *Isatis indigotica* Fort. 之乾燥根。

■ 皮部類白色，木部黃色



混淆品：南板藍根

【基原】爵床科 *Acanthaceae* 植物馬藍 *Strobilanthes cusia* (Ness) Kuntze 之乾燥根莖及根。

■ 根莖髓部明顯，略帶藍色



◎半夏

正品：半夏

【基原】天南星科 *Araceae* 植物半夏 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit. 之乾燥塊莖。

■ 圓球形，頂端有凹陷的莖痕，周圍密布凹點狀的根痕



■ 薑半夏

混淆品：水半夏

【基原】天南星科 *Araceae* 植物鞭檐犁頭尖 *Typhonium flagelliforme* (Lodd.) Blume 之乾燥塊莖。

■ 類橢圓形，側端有葉痕或芽痕



■ 水半夏飲片

◎白附子（禹白附）

正品：白附子（禹白附）

【基原】天南星 *Araceae* 科植物獨角蓮 *Typhonium giganteum* Engl. 之乾燥塊莖。

■ 炮製過，澱粉糊化，無粉質

■ 白附子（禹白附）藥材：
點狀根痕形成環紋



混淆品：白附片（關白附）

【基原】毛茛科 *Ranunculaceae* 植物烏頭 *Aconitum carmichaelii* Debx. 之乾燥子根。

■ 不規則片狀，黃白色，半透明



◎白英

正品：白英

【基原】茄科 Solanaceae 植物白英 *Solanum lyratum* Thunb. 之乾燥全草。

■ 莖表面黃綠色至棕綠色，
被灰白色柔毛



1 cm

混淆品：尋骨風

【基原】馬兜鈴科 Aristolochiaceae 植物綿毛馬兜鈴 *Aristolochia mollissima* Hance 之乾燥全草。

■ 葉灰綠色或黃綠色，
兩面密被白綿毛



■ 尋骨風完整葉片

1 cm

◎石斛

正品：石斛

【基原】蘭科 Orchidaceae 植物石斛 *Dendrobium nobile* Lindl.、粉花石斛 *Dendrobium loddigesii* Rolfe.、黃草石斛 *Dendrobium chrysanthum* Wall.、馬鞭石斛 *Dendrobium fimbriatum* Hook. var. *oculatum* Hook 或鐵皮石斛 *Dendrobium candidum* Wall. ex Lindl 等之新鮮或乾燥莖。

■ 扁圓柱形，節稍膨大



混淆品：流蘇金石斛

【基原】蘭科 Orchidaceae 植物流蘇金石斛 *Ephemerantha fimbriata* (Blume.) Hunt. et Summerh. 之乾燥莖。

■ 假鱗莖膨大



■ 流蘇金石斛（加工後）

◎石菖蒲

正品：石菖蒲

【基原】天南星科 Araceae 植物石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland. 之乾燥根莖。

■質地緻密



混淆品：水菖蒲

【基原】天南星科 Araceae 植物菖蒲 *Acorus calamus* L. 之乾燥根莖。

■質地疏鬆



◎石菖蒲

混淆品：九節菖蒲

【基原】毛茛科 *Ranunculaceae* 植物阿爾泰銀蓮花 *Anemone altaica* Fisch. ex C. A. Mey. 之乾燥根莖。

■ 紡錘形，稍彎曲，表面棕黃色




1 cm

◎艾葉

正品：艾葉

【基原】菊科 Compositae 植物艾 *Artemisia argyi* Levl. et Vant. 之乾燥葉。

- 羽狀深裂，裂片橢圓狀披針形，邊緣有不規則粗鋸齒



混淆品：芙蓉葉

【基原】菊科 Compositae 植物蕪艾 *Crossostephium chinense* (L.) Makino 之乾燥葉。

- 密被白色細絨毛，灰白色，呈狹匙形或狹倒卵形



◎刺五加

正品：刺五加

【基原】五加科 *Araliaceae* 植物刺五加 *Acanthopanax senticosus* (Rupr. et Maxim.) Harms 之乾燥根及根莖或莖。

■ 具髓部



刺五加 - 莖部

1 cm

■ 不具髓



刺五加 - 根部

1 cm

混淆品：紅毛五加皮

【基原】五加科 *Araliaceae* 植物紅毛五加 *Acanthopanax giraldii* Harms 之乾燥莖皮。

■ 捲筒狀，外表面黃棕色，
密生黃棕色、紅棕色的皮刺



1 cm

◎金錢草

正品：金錢草

【基原】報春花科 Primulaceae 植物過路黃 *Lysimachia christinae* Hance 之乾燥全草。

- 全草多皺縮成團，
無毛或被疏柔毛



1 cm

混淆品：廣金錢草

【基原】豆科 Leguminosae 植物廣金錢草 *Desmodium styracifolium* (Osbeck) Merr. 之乾燥全草。

- 葉片近圓形，葉面無毛，
葉背密被灰白色絨毛



1 cm

◎金櫻子

正品：金櫻子

【基原】薔薇科 Rosaceae 植物金櫻子 *Rosa laevigata* Michx. 之乾燥成熟果實。

■ 倒卵形，表面有突起的棕色小點



■ 金櫻子剖面

混淆品：小金櫻子

【基原】薔薇科 Rosaceae 植物小果薔薇 *Rosa cymosa* Tratt. 之乾燥成熟果實。

■ 圓形，表面深棕色，光滑無刺



1 cm

◎胡麻仁

正品：胡麻仁

【基原】胡麻科 Pedaliaceae 植物胡麻 *Sesamum indicum* L. 之乾燥成熟種子。



1 cm



■ 表面黑色，較小

混淆品：亞麻子

【基原】亞麻科 Linaceae 植物亞麻 *Linum usitatissimum* L. 之乾燥成熟種子。



1 cm




■ 表面亮紅棕色，一端略尖而突出，較大

◎重樓

正品：重樓

【基原】百合科 Liliaceae 植物雲南重樓 *Paris polyphylla* Smith var. *yunnanensis* (Franch.) Hand. -Mazz. 或七葉一枝花 *Paris polyphylla* Smith var. *chinensis* (Franch.) Hara 之乾燥根莖。

■ 切面白色或淺棕色



1 cm

混淆品：拳參（紅重樓）

【基原】蓼科 Polygonaceae 植物拳參 *Polygonum bistorta* L. 之乾燥根莖。

■ 切面棕紅色



1 cm



■ 切面近邊緣有一圈黃白色小點（維管束）

◎茵陳（綿茵陳）

正品：茵陳（綿茵陳）

【基原】菊科 Compositae 植物濱蒿 *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. 或茵陳蒿 *Artemisia capillaris* Thunb. 之乾燥地上部分，春季採收的幼苗。

■ 幼苗捲縮成團狀，灰白色或灰綠色



■ 全體密被白色絨毛

1 cm

混淆品：北茵陳（牛至）

【基原】唇形科 Labiatae 植物牛至 *Origanum vulgare* L. 之乾燥全草。

■ 葉對生，多脫落，
黃綠色，呈卵形

■ 莖方柱形，棕
色，節明顯



■ 葉片展開圖

1 cm

◎馬錢子（番木鱉）

正品：馬錢子（番木鱉）

【基原】馬錢科 Loganiaceae 植物馬錢 *Strychnos nux-vomica* L. 之乾燥成熟種子。

■ 扁圓形，似鈕扣狀，表面灰棕色，密生銀灰色毛



混淆品：木鱉子

【基原】葫蘆科 Cucurbitaceae 植物木鱉 *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng. 之乾燥成熟種子。

■ 表面灰棕色至棕黑色，粗糙，邊緣有十數個排列不規則的齒狀突起



◎敗醬草

正品：敗醬草

【基原】敗醬科 Valerianaceae 植物黃花敗醬 *Patrinia scabiosaeifolia* Fisch. ex Trev. 或白花敗醬 *Patrinia villosa* Juss. 之乾燥全草。

■ 具特異醬臭味



混淆品：荇蓂

【基原】十字花科 Cruciferae 植物荇蓂 *Thlaspi arvensis* L. 之乾燥全草。


■ 無特異醬臭味



◎番紅花


正品：番紅花

【基原】鳶尾科 Iridaceae 植物番紅花 *Crocus sativus* L. 之乾燥柱頭。



混淆品：紅花

【基原】菊科 Compositae 植物紅花 *Carthamus tinctorius* L. 之乾燥管狀花。



◎漏蘆（祁州漏蘆）

正品：漏蘆（祁州漏蘆）

【基原】菊科 Compositae 植物祁州漏蘆 *Rhaponticum uniflorum* (L.) DC. 之乾燥根。

■ 切面具網狀裂紋



混淆品：禹州漏蘆

【基原】菊科 Compositae 植物藍刺頭 *Echinops latifolius* Tausch 或華東藍刺頭 *Echinops grijisii* Hance 之乾燥根。

■ 切面具放射狀紋理



◎貫眾（綿馬貫眾）

正品：貫眾（綿馬貫眾）

【基原】鱗毛蕨科 *Dryopteridaceae* 植物粗莖鱗毛蕨 *Dryopteris crassirhizoma* Nakai 之葉柄殘基的乾燥根莖。

■ 黃白色維管束小點環狀排列



混淆品：單芽狗脊貫眾

【基原】烏毛蕨科 *Blechnaceae* 植物單芽狗脊蕨 *Woodwardia unigemmata* (Makino) Nakai 之乾燥根莖。

■ 分體中柱散在



◎貫眾（綿馬貫眾）

混淆品：本貫眾

【基原】桫欏科 Cyatheaceae 植物筆筒樹 *Cyathea lepifera* (J. Sm. ex Hook.) Copel 之乾燥莖。

■ 分體中柱波浪形



混淆品：蘇鐵蕨貫眾

【基原】烏毛蕨科 Blechnaceae 植物蘇鐵蕨 *Brainea insignis* (Hook.) J. Sm. 帶葉柄殘基之乾燥根莖。


■ 黃色分體中柱呈「V」、「U」字形



◎劉寄奴（南劉寄奴）

正品：劉寄奴（南劉寄奴）

【基原】菊科 Compositae 植物奇蒿 *Artemisia anomala* S. Moore 或白苞蒿 *Artemisia lactiflora* Wall. ex DC. 之乾燥地上部分。



混淆品：北劉寄奴

【基原】玄參科 Scrophulariaceae 植物陰行草 *Siphonostegia chinensis* Benth. 之乾燥全草。

■ 莖表面棕褐色或黑棕色

■ 花萼長筒狀



◎墨旱蓮

正品：墨旱蓮

【基原】菊科 Compositae 植物鱧腸 *Eclipta prostrata* L. 之乾燥地上部分。



混淆品：紅旱蓮

【基原】金絲桃科 Guttiferae 植物湖南連翹 *Hypericum ascyron* L. 之乾燥全草。



◎橘紅

正品：橘紅

【基原】芸香科 Rutaceae 植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培品種之乾燥外層果皮。

- 外表面黃棕色，密布點狀凹下或凸起的油室，不含橘白



混淆品：化橘紅

【基原】芸香科 Rutaceae 植物化州柚 *Citrus grandis* (L.) Osbeck var. *tomentosa* Hort. 或柚 *Citrus grandis* (L.) Osbeck 之未成熟或近成熟之乾燥外層果皮。

- 外表面黃綠色至黃棕色



(化橘紅 - 化州柚)

1 cm

◎橘紅

混淆品：陳皮

【基原】芸香科 *Rutaceae* 植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培品種之乾燥成熟果皮。

■ 內有橘白



■ 陳皮飲片

1 cm

混淆品：橙皮（柳丁皮）

【基原】芸香科 *Rutaceae* 植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 或甜橙 *Citrus sinensis* Osbeck 之乾燥成熟果皮。

■ 內表面淡黃白色



1 cm

◎澤蘭

正品：澤蘭

【基原】唇形科 Labiatae 植物毛葉地瓜兒苗 *Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus* Regel 或地瓜兒苗 *Lycopus lucidus* Turcz. 之乾燥地上部分。

■ 莖呈方形，葉披針形，鋸齒緣



■ 葉對生，花簇生於葉腋

混淆品：佩蘭

【基原】菊科 Compositae 植物佩蘭 *Eupatorium fortunei* Turcz. 之乾燥地上部分。

■ 莖呈圓柱形，葉長圓形



■ 葉對生，節有毛

- 簡明中藥鑑別手冊 -

三、非藥用部位過多

※ 註釋：中藥材之夾雜物，基於藥品品質及安全考量，非毒劇類之藥材，若臺灣中藥典或其他各國藥典未收載其夾雜物限量者，應不得超過 5%。【98 年 9 月 25 日行政院衛生署中藥藥物諮詢委員會中藥製劑小組第七次會議紀錄】。

◎山茱萸

正品：山茱萸

【基原】山茱萸科 *Cornaceae* 植物山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. 之乾燥成熟果肉。



1 cm

非藥用部位過多：山茱萸果實

【基原】山茱萸科 *Cornaceae* 植物山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. 含果柄之乾燥成熟果實。

■ 本品所含果柄或種子及其他夾雜物不得超過2%



1 cm

◎花椒

正品：花椒

【基原】芸香科 Rutaceae 植物青椒 *Zanthoxylum schinifolium* Sieb. et Zucc. 或花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim. 之乾燥成熟果皮。



(花椒 - 青椒)

1 cm



■ 黃綠色或棕綠色，具凹下油點



(花椒 - 花椒)

1 cm



■ 紅紫色或紅棕色，具點狀凸起油點

◎花 椒



非藥用部位過多：花椒果實

【基原】芸香科 *Rutaceae* 植物青椒 *Zanthoxylum schinifolium* Sieb. et Zucc. 或花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim. 之乾燥成熟果實。




(花椒 - 青椒果實)

1 cm



(花椒 - 花椒果實)

1 cm



◎枳椇子

正品：枳椇子

【基原】鼠李科 Rhamnaceae 植物植物南枳椇 *Hovenia acerba* Lindl. 之乾燥成熟種子。



1 cm

非藥用部位過多：枳椇子帶果梗果實

【基原】鼠李科 Rhamnaceae 植物植物南枳椇 *Hovenia acerba* Lindl. 帶肉質果梗之乾燥果實。



帶肉質果梗之枳椇子果實

1 cm



枳椇子果實

1 cm

◎夏枯草

正品：夏枯草

【基原】唇形科 Labiatae 植物夏枯草 *Prunella vulgaris* L. 之乾燥果穗。



非藥用部位過多：夏枯草全草

【基原】唇形科 Labiatae 植物夏枯草 *Prunella vulgaris* L. 之乾燥全草。



◎ 柴胡

正品：柴胡


【基原】繖形科 Umbelliferae 植物柴胡 *Bupleurum chinense* DC. 或狹葉柴胡 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. 之乾燥根。



非藥用部位過多：柴胡根莖及莖

【基原】繖形科 Umbelliferae 植物柴胡 *Bupleurum chinense* DC. 或狹葉柴胡 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. 之乾燥根莖、莖及葉。

■ 本品所含莖及葉不得超過10%



◎桂心

正品：桂心

【基原】樟科 Lauraceae 植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl
去栓皮層之乾燥樹皮。



非藥用部位過多：桂皮（肉桂）

【基原】樟科 Lauraceae 植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl
之乾燥樹皮。



◎桂心

非藥用部位過多：肉桂枝皮

【基原】樟科 Lauraceae 植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 之乾燥枝皮。



1 cm


◎蒲黃

正品：蒲黃

【基原】香蒲科 Typhaceae 植物水燭香蒲 *Typha angustifolia* L.、東方香蒲 *Typha orientalis* Presl 或同屬植物之乾燥花粉。



1 cm



蒲黃顯微放大圖

非藥用部位過多：草蒲黃

【基原】香蒲科 Typhaceae 植物水燭香蒲 *Typha angustifolia* L.、東方香蒲 *Typha orientalis* Presl 或同屬植物之乾燥雄花。



1 cm

- 簡明中藥鑑別手冊 -

附錄

◎多藥用部位植物一覽表

植物	學名	藥材名稱	藥用部位
丁香	桃金娘科 <i>Myrtaceae</i> 植物丁香 <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg	丁香	花蕾
		母丁香(雞舌香)	成熟果實
人參	五加科 <i>Araliaceae</i> 植物人參 <i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer	人參	乾燥根
		人參葉	葉
		紅參	經蒸製後的乾燥根
川楝	楝科 <i>Meliaceae</i> 植物川楝 <i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc.	川楝子	成熟果實
		苦楝皮	樹皮及根皮
五葉木通、三葉木通或白木通	木通科 <i>Lardizabalaceae</i> 植物五葉木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三葉木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. 或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.	木通	藤莖
		預知子(八月札)	果實
水燭香蒲、東方香蒲	香蒲科 <i>Typhaceae</i> 植物水燭香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、東方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl 或同屬植物	蒲黃	花粉
		草蒲黃	帶有雄花的花粉
北馬兜鈴或馬兜鈴	馬兜鈴科植物北馬兜鈴 <i>Aristolochia contorta</i> Bge. 或馬兜鈴 <i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc.	馬兜鈴	成熟果實
		青木香	根
		天仙藤	地上部位
肉桂	樟科 <i>Lauraceae</i> 植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl	桂皮	樹皮
		桂心	去栓皮層之乾燥樹皮
		桂枝	嫩枝

植物	學名	藥材名稱	藥用部位
何首烏	蓼科 Polygonaceae 植物 何首烏 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.	何首烏	塊根
		首烏藤 (夜交藤)	藤莖
忍冬	忍冬科 Caprifoliaceae 植物 忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb.	金銀花	花蕾
		忍冬藤	莖枝
皂莢	豆科 Leguminosae 植物 皂莢 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	皂莢 (皂角)	成熟果實
		豬牙皂	不育果實
		皂角刺 (皂刺)	莖上之乾燥棘刺
芍藥	毛茛科 Ranunculaceae 植物 芍藥 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.	白芍	去皮乾燥根
		赤芍	根
車前或 平車前	車前科 Plantaginaceae 植物 車前 <i>Plantago asiatica</i> L. 或 平車前 <i>Plantago depressa</i> Willd.	車前子	成熟種子
		車前草	全草
枸杞或 寧夏枸杞	茄科 Solanaceae 植物 枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill. 或 寧夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L.	枸杞子	成熟果實
		地骨皮	根皮
栝樓或 雙邊栝樓	葫蘆科 Cucurbitaceae 植物 栝樓 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或 雙邊栝樓 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms	栝樓	成熟果實
		栝樓仁	成熟種子
		栝樓皮	成熟果皮
		栝樓根 (天花粉)	根
桑	桑科 Moraceae 植物 桑 <i>Morus alba</i> L.	桑白皮	除去栓皮層乾燥根皮
		桑枝	嫩枝
		桑葉	葉
		桑椹	果穗
烏頭	毛茛科 Ranunculaceae 植物 烏頭 <i>Aconitum carmichaeli</i> Debx.	川烏	主根 (母根)
		附子	子根
		天雄	形長之塊根

植物	學名	藥材名稱	藥用部位
益母草	唇形科 Labiatae 植物 益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	益母草	地上部分
		茺蔚子	成熟果實
真菌茯苓	多孔菌科 Polyporaceae 真菌 茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf	茯苓	菌核
		茯苓皮	菌核之乾燥外皮
		茯神	菌核中間天然抱有松根（即茯神木）的白色部分
草麻黃、中麻黃或木賊麻黃	麻黃科 Ephedraceae 植物 草麻黃 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黃 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey. 或木賊麻黃 <i>Ephedra equisetina</i> Bge.	麻黃	草質莖
		麻黃根	根和根莖
荊芥	唇形科 Labiatae 植物 荊芥 <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq.	荊芥	地上部分
		荊芥穗	花穗
荔枝	無患子科 Sapindaceae 植物 荔枝 <i>Litchi chinensis</i> Sonn.	荔枝核	種子
		荔枝殼	外果皮
馬藍	爵床科 Acanthaceae 植物 馬藍 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek	南板藍根	根及根莖
		馬藍葉	葉
		青黛	葉或莖葉經加工製得乾燥粉末或團塊
側柏	柏科 Cupressaceae 植物 側柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	側柏葉	枝梢及葉
		柏子仁	成熟種仁
蓬莪朮、廣西莪朮或溫鬱金	薑科 Zingiberaceae 植物 蓬莪朮 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val.、廣西莪朮 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 或溫鬱金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling	莪朮	根莖
		鬱金	塊根

植物	學名	藥材名稱	藥用部位
連翹	木犀科 Oleaceae 植物 連翹 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	青翹	初熟時採收之果實
		老翹	熟透後採收之果實
鹿	鹿科 Cervidae 動物 梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck 或馬鹿 <i>Cervus elaphus</i> L.	鹿茸	雄鹿未骨化密生茸毛的幼角
		鹿角	已骨化之角或鋸茸後翌年春天脫落的角基
紫蘇	唇形科 Labiatae 植物 紫蘇 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.	紫蘇子	成熟果實
		紫蘇梗	莖
		紫蘇葉	葉
菘藍	十字花科 Cruciferae 植物 菘藍 <i>Isatis indigotica</i> Fort.	北板藍根	根
		大青葉	葉
		青黛	葉或莖葉經加工製得乾燥粉末或團塊
當歸	繖形科 Umbelliferae 植物 當歸 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	全歸	根(包含當歸頭、當歸身及當歸尾)
		當歸身	去除當歸頭、當歸尾之乾燥主根
		當歸頭	根頭
		當歸尾	支根
槐	豆科 Leguminosae 植物 槐樹 <i>Sophora japonica</i> L.	槐米	花蕾
		槐花	花
		槐角(槐實)	果實
酸橙	芸香科 Rutaceae 植物 酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培變種	枳殼	未成熟果實
		枳實	幼果
銀杏	銀杏科 Ginkgoaceae 植物 銀杏 <i>Ginkgo biloba</i> L.	銀杏葉	葉
		白果	除去肉質外種皮之乾燥種子

植物	學名	藥材名稱	藥用部位
蓮	睡蓮科 <i>Nymphaeaceae</i> 植物 蓮 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	荷葉	葉
		蓮花 (荷花)	花蕾
		蓮鬚	雄蕊
		蓮房	花托
		石蓮子	成熟果實
		蓮子	成熟種子
		蓮子心	幼葉及胚根
		蓮肉	去蓮子心之種子
		蓮衣	種皮
		蓮藕	根莖
		藕節	根莖節部
		蓮梗	葉柄或花柄
橘	芸香科 <i>Rutaceae</i> 植物 橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培品種	橘紅	外層果皮
		陳皮	成熟果皮
		橘核	成熟種子
		橘絡	果皮內層之筋絡
濱蒿或茵陳蒿	菊科 <i>Compositae</i> 植物 濱蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit. 或 茵陳蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	綿茵陳	春季採收的幼苗
		茵陳蒿	秋季採割帶花蕾
薑	薑科 <i>Zingiberaceae</i> 植物 薑 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.	乾薑	乾燥根莖
		生薑	新鮮根莖
薑黃	薑科 <i>Zingiberaceae</i> 植物 薑黃 <i>Curcuma longa</i> L.	薑黃	根莖
		鬱金 (黃絲鬱金)	塊根
檳榔	棕櫚科 <i>Palmae</i> 植物 檳榔 <i>Areca catechu</i> L.	檳榔	成熟種子
		大腹皮	成熟果皮

◎處方中應使用之藥材名稱

處方名	藥材名稱	正確藥材
紫菀湯	貝母	川貝母
七釐散類 (衛署成製第 010614 號等)	貝母	川貝母
三痹湯	牛膝	川牛膝
小兒萬病回春丹	製白附子	禹白附
小兒驚風散	製白附子	禹白附
小續命湯	防己	粉防己
五加皮湯加減味	金不換	石松科千層塔
天王補心丹	菖蒲	石菖蒲
天麻鉤藤飲	牛膝	川牛膝
止痛散加減味	金不換	石松科千層塔
加味麻仁丸	南木香	廣木香
瓜蒌枳實湯	貝母	川貝母
瓜蒌枳實湯	瓜蒌	瓜蒌實
安中散	茴香	小茴香
百合固金湯	貝母	川貝母
折衝飲	牛膝	川牛膝
身痛逐瘀湯	牛膝	川牛膝
兒科杏蘇飲	貝母	浙貝母

處方名	藥材名稱	正確藥材
延齡固本丹	菖蒲	石菖蒲
虎潛丸	牛膝	懷牛膝
洗肝明目散	白蒺藜	刺蒺藜
桔梗湯（濟生方）	貝母	浙貝母
消風散	胡麻	黑芝麻
白鳳丸	牛膝	懷牛膝
真人活命飲（仙方活命飲）	貝母	浙貝母
敗醬草	敗醬	黃花敗醬、白花敗醬
清肺飲	貝母	川貝母
疏經活血湯	牛膝	川牛膝
疏經活血湯	防己	粉防己
當歸飲子	白蒺藜	刺蒺藜
養血壯筋健步丸	牛膝	懷牛膝
獨活寄生湯	牛膝	川牛膝
獨活寄生湯	寄生	桑寄生
濟生腎氣丸	牛膝	懷牛膝
還少丹	牛膝	懷牛膝
還睛丸	白蒺藜	刺蒺藜
玉女煎	牛膝	懷牛膝
孔聖枕中丹	九節菖蒲	石菖蒲

處方名	藥材名稱	正確藥材
寶眼明丸（去羚羊角） （衛署成製第 015050 號）	蒺藜	刺蒺藜
柴胡清肝湯	甘草節	甘草節、甘草
血府逐瘀湯	牛膝	川牛膝
保骨痠痛寧丸 （衛署成製第 015134 號）	楓樹葉	金縷梅科植物楓香
川貝枇杷膏 （衛署成製第 015251 號）	沙參	北沙參
左歸丸	牛膝	懷牛膝
調經種子丸	蘼艾	菊科植物艾之 乾燥葉
女科柏子仁丸	牛膝	川牛膝
明目地黃丸	白蒺藜	沙苑蒺藜

參考文獻

1. 行政院衛生署臺灣中藥典編修小組：臺灣中藥典，行政院衛生署中醫藥委員會，2013。
2. 何玉鈴、林宜信、張永勳：台灣市售易混淆中藥圖鑑，行政院衛生署中醫藥委員會，2006。
3. 何玉鈴、張永勳：易混淆藥材辨識數位學習課程，行政院衛生署中醫藥委員會，2010。
4. 施養志：易混淆及誤用中藥材鑑別圖鑑，行政院衛生署食品藥物管理局，2012。
5. 香港浸會大學中醫藥學院：香港容易混淆中藥，香港中藥聯商會，2005。
6. 高天愛、王滿恩、劉如良：最新中藥材真偽圖鑑，山西科學技術出版社，2012。
7. 國家中醫藥管理局《中華本草》編委會：中華本草（全十冊），上海科學技術出版社，1999。
8. 國家藥典委員會：中華人民共和國藥典 2015 年版一部，中國醫藥科技出版社，2015。
9. 張永勳、何玉鈴：中藥彩色圖鑑，行政院衛生署中醫藥委員會，2009。
10. 張永勳、何玉鈴：臺灣中藥典圖鑑，衛生福利部，2013。
11. 張永勳、何玉鈴：臺灣市售易混淆中藥鑑別圖鑑，衛生福利部，2015。
12. 張憲昌：易混淆及誤用藥材之鑑別（I），行政院衛生署藥物食品檢驗局，2002。
13. 張憲昌：易混淆及誤用藥材之鑑別（II），行政院衛生署藥物食品檢驗局，2006。

14. 陳士林、林余霖：中國藥材圖鑑－中藥材及混偽品鑑別（1～4卷），中醫古籍出版社，2008。
15. 陳士林、林余霖：中藥飲片標準圖鑑，福建科學技術出版社，2013。
16. 陳忠川、郭昭麟等：臺灣市售中藥材真偽及代用品圖集，行政院衛生署中醫藥委員會，2002。
17. 陳金火：臺灣常見易混淆中藥材圖鑑，台中市藥師公會，2013。
18. 趙中振、陳虎彪：常用中藥材鑑別圖鑑，香港聯合書刊物流有限公司，2010。



藥材中文索引

二劃【丁、九、八、十】

丁香.....	72
九節菖蒲.....	88
八角茴香.....	71
十大功勞葉.....	40

三劃【土、大、小、山、川】

土貝母.....	4
大青葉.....	73
大茴香.....	71
大葉骨碎補.....	48
小決明.....	22
小果微花藤.....	33
小金櫻子.....	92
小飛揚.....	58
小茴香.....	71
山梔子.....	51
山茱萸.....	107
山慈姑.....	74
山藥.....	1
川木通.....	78
川牛膝.....	80
川貝母.....	2

四劃【五、化、天、月、木、毛、水、牛、王】

五加皮.....	76
化橘紅.....	104
天南星.....	6
月季花.....	34
木瓜.....	7
木豆.....	31

木通.....	77
木棉皮.....	47
木薯.....	1
木鱉子.....	96
木鱉根.....	15
毛慈菇.....	74
水半夏.....	83
水梔.....	51
水菖蒲.....	87
水線草.....	11
牛至.....	95
牛膝.....	79
王不留行.....	81

五劃【冬、北、半、平、本、母、白、石】

冬葵子.....	8
冬蟲夏草.....	9
北五味子.....	5
北板藍根.....	82
北茵陳.....	95
北劉寄奴.....	102
北蟲草.....	10
半夏.....	83
平貝母.....	4
本貫眾.....	101
母丁香.....	72
白花蛇舌草.....	11
白附子.....	84
白附片.....	84
白前.....	12
白英.....	85
白茅根.....	13
白草.....	13
白頭翁.....	14
白薇.....	12
白蘞.....	15
石韋.....	16
石斛.....	86

石菖蒲.....	87
石蓮子.....	17

六劃【光、冰、地、肉、艾】

光皮木瓜.....	7
光慈菇.....	75
光葉槲蕨.....	49
冰球子.....	74
地膚子.....	18
肉桂.....	113
肉蓯蓉.....	19
艾葉.....	89

七劃【何、決、沙、皂、芒、豆、赤、防、祁】

何首烏.....	21
決明.....	22
決明子.....	22
沙苑蒺藜.....	24
皂莢.....	27
芒硝.....	28
豆蔻.....	29
赤小豆.....	30
赤豆.....	30
防己.....	32
祁州漏蘆.....	99

八劃【亞、佩、兔、刺、味、委、明、松、泡、玫、直、芙、花、虎、金、青】

亞麻子.....	93
佩蘭.....	106
兔兒菜.....	60
刺五加.....	90
味牛膝.....	80
委陵菜.....	14
明礬.....	28
松香.....	54
泡桐花.....	43

玫瑰花.....	34
直立黃耆.....	26
芙蓉葉.....	89
花椒.....	108
虎掌天南星.....	6
金線連.....	35
金錢草.....	91
金櫻子.....	92
青石韋.....	16
青風藤.....	33
青箱子.....	36
青箱子.....	65
青蒿.....	37

九劃【南、枳、枸、柳、洋、流、禹、紅、胡、苘、苦、重、韭、香】

南五味子.....	5
南板藍根.....	82
南美豬屎豆.....	24
南劉寄奴.....	102
南鶴虱.....	68
枳椇子.....	110
枳實.....	39
枸骨葉.....	40
柳丁皮.....	105
柳枝.....	59
洋金花.....	44
流蘇金石斛.....	86
禹白附.....	84
禹州漏蘆.....	99
紅毛五加皮.....	90
紅旱蓮.....	103
紅花.....	98
紅花桑寄生.....	46
紅重樓.....	94
紅耆.....	57
胡麻仁.....	93
胡黃連.....	38
苘麻子.....	8

苦石蓮.....	17
重樓.....	94
韭菜子.....	42
香加皮.....	76

十劃【凌、夏、拳、柴、桂、桑、浙、海、粉、苳、茵、草、馬、骨】

凌霄花.....	43
夏枯草.....	111
拳參.....	94
柴胡.....	112
桂心.....	113
桂皮.....	113
桑枝.....	45
桑寄生.....	45
浙貝母.....	3
海桐皮.....	47
粉防己.....	32
苳芒決明.....	23
茵陳.....	95
茵陳蒿.....	37
草石蠶.....	9
草豆蔻.....	29
草蒲黃.....	115
草蓯蓉.....	20
馬錢子.....	96
馬藍葉.....	73
骨碎補.....	48

十一劃【密、崖、敗、望、梔、蛇、貫、野、陳、魚、鹿、麥】

密蒙花.....	50
崖薑蕨.....	49
敗醬草.....	97
望江南.....	23
梔子.....	51
蛇床子.....	69
貫眾.....	100
野牡丹.....	81

陳皮.....	105
魚針草.....	62
鹿角.....	52
鹿茸.....	52
麥芽.....	53

十二劃【單、尋、琥、番、紫、結、絡、菟、荇、華、開、黃】

單芽狗脊蕨貫眾.....	100
尋骨風.....	85
琥珀.....	54
番木鱉.....	96
番紅花.....	98
紫雲英.....	25
紫蘇子.....	56
結香花.....	50
絡石藤.....	55
菟絲子.....	56
荇蓂.....	97
華南鶴虱.....	69
開口箭.....	64
黃耆.....	57
黃野百合.....	25
黃藥子.....	21

十三劃【滇、篇】

滇棗仁.....	63
篇蓄.....	58

十四劃【槐、漏、管、綠、綿、蒲、蒺、豨、酸、銀】

槐枝.....	59
漏蘆.....	99
管花肉蓯蓉.....	19
綠衣枳實.....	39
綿茵陳.....	95
綿馬貫眾.....	100
蒲公英.....	60
蒲黃.....	115

蒺藜.....	26
稀蓂草.....	61
酸棗仁.....	63
銀線連.....	35

十五劃【墨、廣、劉、櫛、穀、蓮、蔥、豬】

墨旱蓮.....	103
廣防己.....	32
廣金錢草.....	91
廣藿香.....	67
劉寄奴.....	102
櫛寄生.....	46
穀芽.....	53
蓮藕.....	66
蔥子.....	42
蔥實.....	42
豬牙皂.....	27

十六劃【橘、橙、澤、貓】

橘紅.....	104
橙皮.....	105
澤漆.....	64
澤蘭.....	106
貓兒刺.....	41

十七劃【薜】


薜荔.....	55
---------	----

十八劃【雞】

雞冠子.....	36
雞冠花.....	65

十九劃【懷、藕、藜、關】

懷牛膝.....	79
藕節.....	66
藜實.....	18
關木通.....	78



關白附.....84

二十劃【藿、蘇】

藿香.....67

蘇鐵蕨貫眾.....101

二十一劃【鶴、鐵】

鶴虱.....68

鐵破鐮.....38

二十五劃【鹽】

鹽生肉苁蓉.....20



基原拉丁學名索引

A

<i>Abutilon theophrasti</i> Medic. 苘麻.....	8
<i>Acanthopanax giraldii</i> Harms 紅毛五加.....	90
<i>Acanthopanax gracilistylus</i> W. W. Smith 細柱五加.....	76
<i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms 刺五加.....	90
<i>Achyranthes bidentata</i> Blume 牛膝.....	79
<i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 烏頭.....	84
<i>Acorus calamus</i> L. 菖蒲.....	87
<i>Acorus gramineus</i> Soland. 石菖蒲.....	87
<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Mey.) O. Kuntze 藿香.....	67
<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne. 五葉木通.....	77
<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. 三葉木通.....	77
<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd. 白木通.....	77
<i>Allium fistulosum</i> L. 蔥.....	42
<i>Allium tuberosum</i> Rottl. ex Spreng. 韭菜.....	42
<i>Alpinia katsumadai</i> Hayata 草豆蔻.....	29
<i>Amomum cardamomum</i> L. 白豆蔻.....	29
<i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino 白蘂.....	15
<i>Anemone altaica</i> Fisch. ex C. A. Mey. 阿爾泰銀蓮花.....	88
<i>Anisomeles indica</i> (L.) Kuntze 魚針草.....	62
<i>Anoectochilus formosanus</i> Hayata 臺灣金線連.....	35
<i>Arisaema amurense</i> Maxim. 東北天南星.....	6
<i>Arisaema erubescens</i> (Wall.) Schott 天南星.....	6
<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume 異葉天南星.....	6
<i>Aristolochia fangchi</i> Y. C. Wu ex L. D. Chow & S. M. Hwang 廣防己.....	32
<i>Aristolochia manshuriensis</i> Kom. 東北馬兜鈴.....	78
<i>Aristolochia mollissima</i> Hance 綿毛馬兜鈴.....	85
<i>Artemisia annua</i> L. 黃花蒿.....	37

<i>Artemisia anomala</i> S. Moore 奇蒿	102
<i>Artemisia argyi</i> Levl. et Vant. 艾	89
<i>Artemisia capillaris</i> Thunb. 茵陳蒿	37, 95
<i>Artemisia lactiflora</i> Wall. ex DC. 白苞蒿	102
<i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit. 濱蒿	37, 95
<i>Astragalus adsurgens</i> Pall. 直立黃耆	26
<i>Astragalus complanatus</i> R. Br. 扁莖黃耆	24
<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 膜莢黃耆	57
<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 蒙古黃耆	57
<i>Astragalus sinicus</i> L. 紫雲英	25

B

<i>Beesia calthaefolia</i> (Maxim.) Ulbr. 鐵破鐮	38
<i>Bolbostemma paniculatum</i> (Maxim.) Franquet 土貝母	4
<i>Boschniakia rossia</i> (Cham. et Schitdl) Fedtsch. et Flerov 草蓯蓉	20
<i>Brainea insignis</i> (Hook.) J. Sm. 蘇鐵蕨	101
<i>Buddleja officinalis</i> Maxim. 密蒙花	50
<i>Bupleurum chinense</i> DC. 柴胡	112
<i>Bupleurum scorzoniferolium</i> Willd. 狹葉柴胡	112

C

<i>Caesalpinia minax</i> Hance 喙莢雲實	17
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp. 木豆	31
<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K. Schum. 凌霄	43
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. 美洲凌霄	43
<i>Carpesium abrotanoides</i> L. 天名精	68
<i>Carthamus tinctorius</i> L. 紅花	98
<i>Cassia obtusifolia</i> L. 決明	22
<i>Cassia occidentalis</i> L. 望江南	23
<i>Cassia sophora</i> L. 槐葉決明	23
<i>Cassia tora</i> L. 小決明	22
<i>Celosia argentea</i> L. 青葙	36, 65
<i>Celosia cristata</i> L. 雞冠花	36, 65
<i>Cervus elaphus</i> L. 馬鹿	52
<i>Cervus nippon</i> Temminck 梅花鹿	52

<i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne 光皮木瓜.....	7
<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai 貼梗海棠.....	7
<i>Chamaesyce thymifolia</i> (L.) Millsp. 小飛揚草.....	58
<i>Chenopodium album</i> L. 藜.....	18
<i>Cinnamomum cassia</i> Presl 肉桂.....	113, 114
<i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma 肉蓯蓉.....	19
<i>Cistanche salsa</i> (C. A. Mey) Benth. et Hook. f. 鹽生肉蓯蓉.....	20
<i>Cistanche tubulosa</i> (Schrenk) Wight 管花肉蓯蓉.....	19
<i>Citrus aurantium</i> L. 酸橙.....	39, 105
<i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck 柚.....	104
<i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck var. <i>tomentosa</i> Hort. 化州柚.....	104
<i>Citrus reticulata</i> Blanco 橘.....	104, 105
<i>Citrus sinensis</i> Osbeck 甜橙.....	39, 105
<i>Clematis armandii</i> Franch. 小木通.....	77
<i>Clematis montana</i> Buch.-Ham. 繡球藤.....	77
<i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cuss. 蛇床.....	69
<i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc. 冬蟲夏草菌.....	9
<i>Cordyceps militaris</i> (Fr.) Link 蛹蟲草菌.....	10
<i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. 山茱萸.....	107
<i>Cremastra appendiculata</i> (D. Don) Makino 杜鵑蘭.....	74
<i>Crocus sativus</i> L. 番紅花.....	98
<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino 蘼艾.....	89
<i>Crotalaria pallida</i> Ait. var. <i>obovata</i> (G. Don) Polhill 黃野百合 (豬屎豆).....	25
<i>Crotalaria zanzibarica</i> Benth. 光萼豬屎豆 (南美豬屎豆).....	24
<i>Cuscuta australis</i> R. Br. 南方菟絲子.....	56
<i>Cuscuta chinensis</i> Lam. 菟絲子.....	56
<i>Cyathea lepifera</i> (J. Sm. ex Hook.) Copel 筆筒樹.....	101
<i>Cyathula officinalis</i> Kuan 川牛膝.....	80
<i>Cynanchum atratum</i> Bunge 白薇.....	12
<i>Cynanchum glaucescens</i> (Decne.) Hand.-Mazz. 芫花葉白前.....	12
<i>Cynanchum stauntonii</i> (Decne.) Schltr. ex Levl. 柳葉白前.....	12
<i>Cynanchum versicolor</i> Bunge 蔓生白薇.....	12

D

<i>Daucus carota</i> L. 野胡蘿蔔.....	68
-----------------------------------	----

<i>Datura metel</i> L. 白花曼陀羅	44
<i>Davallia formosana</i> Hayata 大葉骨碎補	48
<i>Dendrobium candidum</i> Wall. ex Lindl. 鐵皮石斛	86
<i>Dendrobium chrysanthum</i> Wall. 黃草石斛	86
<i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook. var. <i>oculatum</i> Hook. 馬鞭石斛	86
<i>Dendrobium loddigesii</i> Rolfe. 粉花石斛	86
<i>Dendrobium nobile</i> Lindl. 石斛	86
<i>Desmodium styracifolium</i> (Osbeck) Merr. 廣金錢草	91
<i>Dioscorea bulbifera</i> L. 黃獨	21
<i>Dioscorea doryphora</i> Hance 恆春薯蕷	1
<i>Dioscorea japonica</i> Thunb. var. <i>pseudojaponica</i> (Hayata) Yamam. 基隆山藥	1
<i>Dioscorea opposita</i> Thunb. 薯蕷	1
<i>Diplazium subinatum</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) Tagawa 單葉雙蓋蕨	16
<i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm. 槲蕨	48
<i>Drynaria propinqua</i> (Wall. ex. Mett.) Bedd. 光葉槲蕨	49
<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai 粗莖鱗毛蕨	100

E

<i>Echinops grijisii</i> Hance 華東藍刺頭	99
<i>Echinops latifolius</i> Tausch. 藍刺頭	99
<i>Eclipta prostrata</i> L. 鱧腸	103
<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl. 結香	50
<i>Ephemerantha fimbriata</i> (Blume.) Hunt. et Summerh. 流蘇金石斛	86
<i>Erythrina arborescens</i> Roxb. 喬木刺桐	47
<i>Erythrina variegata</i> L. var. <i>orientalis</i> (L.) Merr. 刺桐	47
<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg 丁香	72
<i>Eupatorium fortunei</i> Turcz. 佩蘭	106
<i>Euphorbia helioscopia</i> L. 澤漆	64

F

<i>Ficus pumila</i> L. 薜荔	55
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. 茴香	71
<i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don 川貝母	2
<i>Fritillaria delavayi</i> Franch. 梭砂貝母	2

<i>Fritillaria przewalskii</i> Maxim. 甘肅貝母.....	2
<i>Fritillaria taipaiensis</i> P. Y. Li 太白貝母	2
<i>Fritillaria thunbergii</i> Miq. 浙貝母	3
<i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsiao 暗紫貝母.....	2
<i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsiao var. <i>wabuensis</i> (S. Y. Tang et S. C. Yue) Z. D. Liu, S. Wang et S. C. Chen 瓦布貝母	2
<i>Fritillaria ussuriensis</i> Maxim. 平貝母	4

G

<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 梔子	51
<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis var. <i>grandiflora</i> Nakai 水梔子	51
<i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 皂莢	27
<i>Goodyera matsumurana</i> Schltr. 銀線連	35
<i>Gossampinus malabarica</i> (DC.) Merr. 木棉.....	47

H

<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam. 水線草	11
<i>Hedyotis diffusa</i> Willd. 白花蛇舌草.....	11
<i>Hedysarum polybotrys</i> Hand.-Mazz. 多序岩黃耆	57
<i>Hordeum vulgare</i> L. 大麥	53
<i>Hovenia acerba</i> Lindl. 南枳椇	110
<i>Hypericum ascyron</i> L. 湖南連翹.....	103

I

<i>Ilex cornuta</i> Lindl. ex Paxt. 枸骨.....	40
<i>Ilex pernyi</i> Franch. 貓兒刺	41
<i>Illicium verum</i> Hook. f. 八角茴香.....	71
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C. E. Hubb. 白茅	13
<i>Iodes vitiginea</i> (Hance) Hemsl. 小果微花藤.....	33
<i>Isatis indigotica</i> Fort. 菘藍	73, 82
<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai 兔兒菜	60

K

<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. 地膚	18
--	----

L

<i>Linum usitatissimum</i> L. 亞麻	93
<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. 地瓜兒苗	106
<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>hirtus</i> Regel 毛葉地瓜兒苗	106
<i>Lysimachia christinae</i> Hance 過路黃	91

M

<i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr. 闊葉十大功勞	40
<i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde 細葉十大功勞	40
<i>Malva verticillata</i> L. 冬葵	8
<i>Manihot esculenta</i> Crantz 木薯	1
<i>Melastoma candidum</i> D. Don 野牡丹	81
<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng. 木鱉	15, 96
<i>Morus alba</i> L. 桑	45

N

<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 蓮	17, 66
---	--------

O

<i>Origanum vulgare</i> L. 牛至	95
<i>Oryza sativa</i> L. 稻	53

P

<i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>chinensis</i> (Franch.) Hara 七葉一枝花	94
<i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Hand.-Mazz. 雲南重樓	94
<i>Patrinia scabiosaeifolia</i> Fisch. ex Trev. 黃花敗醬	97
<i>Patrinia villosa</i> Juss. 白花敗醬	97
<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl. 泡桐	43
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud. 毛泡桐	43
<i>Pennisetum flaccidum</i> Griseb. 白草	13
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 紫蘇	56
<i>Periploca sepium</i> Bge. 杠柳	76
<i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> Pennell 胡黃連	38

<i>Pinellia pedatisecta</i> Schott 虎掌	6
<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 半夏	83
<i>Pinus massoniana</i> Lamb. 馬尾松	54
<i>Pinus tabulaeformis</i> Carr. 油松	54
<i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe 獨蒜蘭	74
<i>Pleione yunnanensis</i> Rolfe 雲南獨蒜蘭	74
<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. 廣藿香	67
<i>Polygonum aviculare</i> L. 篇蓄	58
<i>Polygonum bistorta</i> L. 拳參	94
<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 何首烏	21
<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf. 枸橘	39
<i>Potentilla chinensis</i> Ser. 委陵菜	14
<i>Prunella vulgaris</i> L. 夏枯草	111
<i>Pseudodrynaria coronans</i> (Wall.) Ching 崖薑蕨	49
<i>Pulsatilla chinensis</i> (Bunge) Regel 白頭翁	14
<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell 石韋	16
<i>Pyrrosia petiolosa</i> (Christ) Ching 有柄石韋	16
<i>Pyrrosia sheareri</i> (Bak.) Ching 廬山石韋	16

R

<i>Rhaponticum uniflorum</i> (L.) DC. 祁州漏蘆	99
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. 月季	34
<i>Rosa cymosa</i> Tratt. 小果薔薇	92
<i>Rosa laevigata</i> Michx. 金櫻子	92
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. 玫瑰	34

S

<i>Salix babylonica</i> L. 柳	59
<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 五味子	5
<i>Schisandra sphenanthera</i> Rehd. et Wils. 華中五味子	5
<i>Sesamum indicum</i> L. 胡麻	93
<i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makino 毛梗豨薟	61
<i>Siegesbeckia orientalis</i> L. 豨薟	61
<i>Siegesbeckia pubescens</i> Makino 腺梗豨薟	61
<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils. 青藤	33
<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils. var. <i>cinereum</i>	

Rehd. et Wils. 毛青藤	33
<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. 陰行草	102
<i>Solanum lyratum</i> Thunb. 白英	85
<i>Sophora japonica</i> L. 槐	59
<i>Stachys sieboldii</i> Miq. 草石蠶	9
<i>Stephania tetrandra</i> S. Moore 粉防己	32
<i>Strobilanthes cusia</i> (Ness) Kuntze 馬藍	73, 82
<i>Strobilanthes forrestii</i> Diels 腺毛馬藍	80
<i>Strychnos nux-vomica</i> L. 馬錢	96

T

<i>Taraxacum formosanum</i> Kitamura 臺灣蒲公英	60
<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz. 蒲公英	60
<i>Taxillus chinensis</i> (DC.) Danser 桑寄生	45
<i>Taxillus parasiticus</i> L. 紅花桑寄生	46
<i>Thlaspi arvense</i> L. 蔞莫	97
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC. 竊衣	69
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem. 絡石	55
<i>Tribulus terrestris</i> L. 蒺藜	26
<i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker 老鴉瓣	75
<i>Tupistra chinensis</i> Bak. 開口箭	64
<i>Typha angustifolia</i> L. 水燭香蒲	115
<i>Typha orientalis</i> Presl 東方香蒲	115
<i>Typhonium flagelliforme</i> (Lodd.) Blume 鞭檐犁頭尖	83
<i>Typhonium giganteum</i> Engl. 獨角蓮	84

V

<i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke 麥藍菜	81
<i>Vigna angularis</i> Ohwi et Ohashi 赤豆	30
<i>Vigna calcaratus</i> Roxb. 赤小豆	30
<i>Viscum coloratum</i> (Komar.) Nakai 槲寄生	46

W

<i>Woodwardia unigemmata</i> (Makino) Nakai 單芽狗脊蕨	100
---	-----

Z

- Zanthoxylum bungeanum* Maxim. 花椒 108, 109
Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc. 青椒 108, 109
Ziziphus jujuba Mill. var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H. F. Chou 酸枣..... 63
Ziziphus mauritiana Lam. 滇刺枣 63



國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

簡明中藥鑑別手冊 / 張永勳, 何玉鈴總編輯. —

第一版. -- 臺北市: 衛福部, 民 106.05

面; 公分

ISBN : 978-986-05-1532-9 (精裝)

1. 中藥材 2. 植物圖鑑

414.3025

105024701

書 名: 簡明中藥鑑別手冊

出版機關: 衛生福利部

發行人: 陳時中

總編輯: 張永勳、何玉鈴

編輯顧問: 江淑端、李威著、高駿彬、張賢哲、張憲昌、陳介甫、
陳益昇、陳聘琪、黃坤森、黃怡超、黃彥豪、黃雅翌、
楊榮季、蔡憲璋、賴尚志、簡美英 (依姓名筆劃排序)

美術編輯: 林玉茹

助理編輯: 李蕙如、林玉茹、吳坤璋、蕭惠薰、林宜薇

研究計畫主持人: 張永勳、何玉鈴

研究計畫協同主持人: 高駿彬

地 址: 11558 台北市南港區忠孝東路 6 段 488 號

網 址: <http://www.mohw.gov.tw/>

電 話: (02)8590-6666

傳 真: (02)8590-7076

出版年月: 中華民國 106 年 5 月

版 次: 第一版第一刷

印刷廠: 洪記印刷有限公司

地 址: 403 臺中市西區明智街 25 號

電 話: (04)2314-0788

銷售處: 國家書店松江門市 104 臺北市松江路 209 號 1 樓

電話: (02)2518-0207

<http://www.govbooks.com.tw>

五南文化廣場 400 臺中市中山路 6 號

電話: (04)2226-0330

<http://www.wunanbooks.com.tw>

定 價: 新臺幣 350 元整

GPN : 1010600714

ISBN : 978-986-05-1532-9

◎欲利用本書內容者，須徵求衛生福利部同意或書面授權◎